Jules Remy

CATALOGUE DES PLANTES DU JARDIN DE M^RS LES APOTICAIRES DE PARIS,

Suivant leurs genres & les caracteres des Fleurs, conformément à la Méthode de Monsieur TOURNEFORT *dans son Edition Françoise de 1694.*

M. DCC. XLI.

Descemet
1757

CATALOGUE DES PLANTES

Du Jardin de Messieurs les Apoticaires de Paris, suivant leurs genres & les caracteres des Fleurs, conformément à la Méthode de Monsieur TOURNEFORT *dans son Edition Françoise de* 1694.

****

CLASSE XVI.

Des Herbes qui ne fleurissent point, & qui ne portent que des Semences.

On a mis ces deux Classes 16. & 17. au commencement, à cause de la situation du terrain pour leur donner l'ombre. Elles doivent être à la fin des Plantes aux Elemens de Botanique.

SECTION PREMIERE.

Des Herbes qui ne fleurissent pas, & qui portent les fruits sur le dos des Feuilles.

FILIX ramosa major, pinnulis obtusis non dentatis, *C. B. P.* 357. Filix fœmina, *Dod. Pempt.* 462. La Fougere femelle. — Hepatique.

Filix non ramosa dentata, *C. P. B.* 358. — idem.

Hepatique.	Filix mas, *Dot. Pempt.* 462. La Fougere mâle.
	Lonchitis aculeata major, *El. Bot.* 430.
idem.	Filix aculeata major, *C. B. P.* 358. La Lonkite.
Bechique.	Trichomanes, ſeu Polytricum officinarum, *C. B. P.* 356. Le Politric.
Hepatique.	Polypodium vulgare, *C. B. P.* 359. Le Polipode.
Bechique.	Filicula fontana major, ſive Adiantum album. Filicis folio, *C. B. P.* 358. Adiante blanc.
idem.	Filicula quæ Adiantum nigrum officinarum, pinnulis obtuſioribus, *I. R. H.* 542. Adiante noir.
idem.	Ruta muraria, *C. B. P.* 356. La Sauve-vie.
idem.	Adiantum foliis Coriandri, *C. B. P.* 355. Le Capillaire de Montpellier.
idem.	Adiantum Americanum, *Corn.* 7. Le Capillaire de Canada.
idem.	Aſplenium ſive Ceterac, *J. B.* 3. 749. Le Ceterac.
Hepatique.	Lingua Cervina officinarum, *C. B. P.* 353. La Scolopendre ou Langue de Cerf.

SECTION II.

Des Herbes qui n'ont point de fleurs, & qui portent leurs ſemences en grape, en épi ou dans des boëtes.

Oſmunda regalis, ſive Filix florida, *Park.* 1038. Hepatique.
Filix floribus inſignis, *J. B.* 3. 736.
L'Oſmonde ou Fougere fleuriſſante.

Ophioglоſſum Vulgatum, *C. B. P.* 354. Vulneraire Deterſive.
La Langue de Serpent.

Lichen petræus latifolius, ſive Hepatica fontana, *C. B. P.* 362. Hepatique.
L'Hepatique de fontaine.

CLASSE XVII.

Des Herbes dont on ne connoît ordinairement ni les fleurs ni les graines.

SECTION PREMIERE.

Des Herbes dont on ne connoît ordinairement ni les fleurs, ni les graines, & qui ſe trouvent ſur la terre.

MUſcus Saxatilis aut Sylveſtris, *Trag.* 946. Diaphoretique & Sudorifique.
Politricum Aureum majus, *C. B. Pin.* 356.
Perce mouſſe.

CLASSE PREMIERE.

Ici commencent les Plantes au Livre des Elemens de Botanique.

Des Herbes à fleur, d'une seule feuille réguliere semblable en quelque maniere à une cloche, à un bassin ou à un godet.

SECTION PREMIERE.

Des Herbes à fleur en cloche, dont le pistile devient un fruit mou & assez gros.

Assoupissante. Mandragora fructu rotundo, *C. B. P.* 169.
Mandragora mas, *J. B.* 3. 617.
La Mandragore mâle.

idem. Mandragora flore subcæruleo purpurascente, *C. B. P.* 169.
Mandragora fœmina, *J. B.* 3. 618.
La Mandragore femelle.

idem. Belladona majoribus foliis & floribus, *I. R. H.* 77.

SECTION II.

Des Herbes à fleur en cloche ou en grelot, dont le pistile devient un fruit mou & assez petit.

Cephalique. Lilium Convallium album, *C. B. P.* 304.
Le Muguet ou Lis des vallées.

Vulneraire astringente. Poligonatum latifolium vulgare, *C. B. P.* 303.
Le Seau de Salomon.

Aperitive. Ruscus myrtifolius aculeatus. *I. R. H.* 79. Ruscus *Math.* 1214.
Le petit Houx, le Houx frilon.

Ruſcus latifolius fructu folio innaſcente, *I.R.H.* 79. — Aperitive.
Le Laurier Alexandrin.

Section III.

Des Herbes à fleur en cloche, dont le piſtile devient un fruit ſec, qui n'a qu'une ſeule cavité dans quelques genres, & qui eſt partagé en cellules dans quelques autres.

Menyanthes paluſtre, *E. B.* 71. Trifolium paluſtre, *C. B. P.* 327. — Antiſcorbutique.
Le Méniante ou Tréfle d'eau.

Convolvulus maritimus noſtràs, *Mor. Hiſt.* 11. Soldanella maritima minor, *C. B. P.* 205. — Purgative.
La Soldanele, Chou marin.

Convolvulus major albus, *C. B. P.* 294. — idem.
Le grand Lizeron.

Convolvulus Syriacus, & Scammonia Syriaca, *Mor. Hiſt. Oxon. part.* 2. p. 12. — idem.
La Scamonée de Syrie.

Convolvulus minor arvenſis, *C. B. P.* 294. — idem.
Le petit Lizeron.

Tithymalus latifolius Cataputia dictus, *H.L.B.* Lathyris major, *C. B. P.* 293. — idem.
L'Eſpurge.

Tithymalus Paluſtris, fruticoſus, *C. B. P.* 292. — idem.
Titimale, grande Eſule.

Tithymalus Cypariſſias, *C. B. P.* 291. Eſula officinarum, *Cæſalp.* 374. — idem.
La petite Eſule.

Rhabarbarum fortè Dioſcoridis & antiquorum, *I. R. H.* 89. — Purgative.
Le Rapontic.

Alexitere & Cordiale. Oxis flore albo, *C. B.* 76. Oxis five trifolium acidum, *J. B.* 2. 387.
L'Alleluia, Pain à Coucou.

idem. Oxis lutea, *J. B.* 2. 388.
L'Alleluia à fleur jaune.

SECTION IV.

Des Herbes à fleur en cloche ou en bassin, dont le pistile devient un fruit à gaînes.

Rafraichissante & épaississante. Cotyledon major, *C. B. P.* 285.
Le Nombril de Venus.

idem. Cotyledon radice tuberosâ longâ repente, *Mor. H. R. B.*
Le Nombril de Venus à fleurs jaunes.

Apocinum majus Syriacum rectum, *Corn.* 90.
L'Apocin qui porte la Houette.

Purgative. Periploca Monspeliaca foliis rotundioribus, *I. R. H.* 93.
La Scamonée de Montpellier.

Alexitere & Cordiale. Asclepias albo flore, *C. B. P.* 303.
Le Dompte venin.

SECTION V.

Des Herbes à fleur en cloche, du fond desquelles s'éleve un tuyau, & dont le pistile devient un fruit composé de plusieurs Capsules, ou divisé en plusieurs Loges.

Emolliente. Malva vulgaris flore majore folio sinuato, *J. B.* 2. 949.
La Grande Mauve.

Malva

Malva vulgaris flore minore folio rotundo, *J. B.* 2. 949. Emolliente.
La petite Mauve.

Malva Rosea folio subrotundo, *C. B. P.* 315. idem.
La Mauve Rose, Doutremer ou Tremiere.

Malva foliis crispis, *C. B. P.* 315. idem.
La Mauve frisée.

Althæa maritima arborea Veneta, *I. R. H.* 97. idem.
Malva arborea, *J. B.* 2. 952.
La Mauve en arbre.

Althæa Dioscoridis & Plinii, *C. B. P.* 315. idem.
La Guimauve.

Alcea vulgaris major, *C. B. P.* 316. idem.
L'Alcée.

Abutilon, *Dod. Pempt.* 656. Althæa Theophrasti flore luteo, *C. B. P.* 316. idem.
La Mauve des Indes, fausse Guimauve, ou l'Abutilon.

Ketmia vesicaria vulgaris, *I. R. H.* 101. idem
La Ketmie.

Xilon, sive Gossypium herbaceum, *J. B.* 1. 343.
Le Coton.

SECTION VI.

Des Herbes à fleur en cloche ou en bassin, dont le calice devient un fruit charnu dans presque tous les genres.

Bryonia aspera sive alba baccis rubris, *C. B. P.* 297. Purgative.
La Couleuvrée, Brione ou Vigne blanche.

Tamnus racemosa flore minore, luteo pallescente, *I. R. H.* 103. Resolutive.

Vitis nigra quibusdam, sive Tamnus Plinii folio Cyclaminis, *J. B.* 2. 147.
La Racine Vierge ou Seau de Nôtre-Dame.

Sicyoides Canadense fructu Echinato, *El. Bot.* 86.

Vulneraire Detersive. Momordica vulgaris, *I. R. H.* 103. Balsamina rotundifolia repens, sive mas, *C. B. P.* 306.
La Pomme de Merveille.

Purgative. Cucumis sylvestris asininus dictus, *C. B. P.* 314.
Le Concombre sauvage.

Rafraichissante. Cucumis sativus vulgaris, maturo fructu subluteo, *C. B. P.* 310.
Le Concombre ordinaire.

Purgative. Colocynthis fructu rotundo minor, *C. B. P.* 313.
La Coloquinte.

Rafraichissante & épaississante. Melo vulgaris, *C. B. P.* 310.
Le Melon.

idem. Pepo oblongus, *C. B. P.* 311.
La Citrouille.

idem. Melopepo Compressus, *C. B. P.* 312.
Le Potiron.

idem. Anguria Citrullus dicta, *C. B. P.* 312.
Le Melon d'eau, ou Angurie.

idem. Cucurbita longa folio molli, flore albo, *J. B.* 2. 214.
La Courge, ou la Calebasse.

SECTION VII.

Des Herbes à fleur en cloche, dont le calice devient un fruit sec.

Rafraichissante. Campanula radice Esculentâ flore cæruleo, *H. L. B.*
Rapunculus Esculentus, *C. B. P.* 92.
La Réponce.

Campanula Vulgatior ſoliis urticæ, ſive major & aſperior, *C. B. P.* 94. — Vulneraire Deterſive.
La Campanule gantelée, ou Gand Nôtre-Dame.

Rapunculus Spicatus, *C. B. P.* 92. — idem.
La Réponce Sauvage.

SECTION VIII.

Des Herbes à fleur en godet, dont le calice devient un fruit à deux pieces attachées au même endroit.

Rubia tinctorum ſativa, *C. B. P.* 333. — Aperitive.
La Garance.

Rubia Sylveſtris, Monſpeſſulana, major, *J. B.* 3. 715. — idem.
La Garence Sauvage.

Aparine vulgaris, *C. B. P.* 334. — idem.
La Rieble, ou le Pateron.

Aparine latifolia humilior montana, *I. R. H.* 114. — Hepatique.
Aſperula, ſive Rubeola montana Odora, *C.B.P.* 334.
L'Hepatique des Bois.

Gallium luteum, *C. B. P.* 335. — Cephalique.
Le Caillelaict jaune.

Gallium album vulgare, *El. Bot.* 94. Mollugo montana anguſtifolia, vel Gallium album latifolium, *C. B. P.* 335. — idem.
Le Caillelaict blanc.

Cruciata hirſuta, *C. P. B.* 334. — Vulneraire aſtringente.
La Croiſette velue.

Cruciata alpina latifolia lævis, *El. Bot.* 94. — idem.
Grande Croiſette.

SECONDE CLASSE.

Des Herbes à fleur d'une feuille réguliere ſemblable en quelque maniere à un entonnoir, à une ſoucoupe, ou à une roſette.

SECTION PREMIERE.

Des Herbes à fleur en entonnoir, & dont le piſtile devient le fruit.

Febrifuge. GEntiana major lutea, *C. B. P.* 187.
La Gentiane.

idem. Gentiana Cruciata, *C. B. P.* 188.
La Gentiane Croiſette.

Errhine ou Sternutatoire. Nicotiana major latifolia, *C. B. P.* 169.
Le Tabac maſle.

idem. Nicotiana minor, *C. B. P.* 170. &c.
L'Herbe à la Reine.

Aſſoupiſſante. Hyoſcyamus vulgaris vel niger, *C. B. P.* 169.
La Juſquiame, Hannebane ou Pottelée.

idem. Hyoſcyamus albus major, vel tertius Dioſcoridis, & quartus Plinii, *C. B. P.* 169.
La Juſquiame blanche.

idem. Stramonium fructu ſpinoſo oblongo ſemine nigricante, *El. Bot.* 98. Solanum pomo ſpinoſo rotundo, longo flore, *C. B. P.* 168.
La Pomme Eſpineuſe.

Vulneraire aſtringente. Pervinca vulgaris latifolia, *El. Bot.* 99. Clematitis Daphnoides major, *C. B. P.* 302.
La Grande Pervanche.

idem. Pervinca vulgaris anguſtifolia, *El. Bot.* 99. Cle-

matitis Daphnoides minor, *C. B. P.* 301.
La Petite Pervanche.

Auricula Ursi flore luteo, *J. B.* 3. 499. — **Vulneraire astringente.**
L'Oreille d'Ours.

SECTION II.

Des Herbes à fleur en soucoupe ou en rosette, dont le pistile devient le fruit.

Androsace vulgaris latifolia annua, *El. Bot.* 101. — **Aperitive.**
L'Androsace.

Primula veris odorata flore luteo simplici, *J. B.* 3. 495. — **Cephalique.**
La Primevere, Primerose, fleurs de coucou.

Centaurium minus, *C. B. P.* 278. — **Febrifuge.**
La petite Centaurée.

Plantago latifolia sinuata, *C. B. P.* 189. — **Vulneraire astringent.**
Le grand Plantin.

Plantago latifolia incana, *C. B. P.* 189. — **idem.**
Le Plantin moyen.

Plantago angustifolia major, *C. P. B.* 189. — **idem.**
Le Plantin à cinq nerfs.

Coronopus hortensis, *C. B. P.* 190. — **idem.**
La Corne de Cerf.

Psillium majus supinum, *C. B. P.* 191. — **Rafraichissante & épaississante.**
L'Herbe aux Puces.

Psillium majus erectum, *C. B. P.* 191. — **idem.**
L'Herbe aux Puces annuel.

SECTION III.

Des Herbes à fleur en entonnoir, dont le calice devient le fruit, ou dont le calice enveloppe le fruit.

Purgative. Jalap officinarum fructu rugoſo, *El. Bot.* 105.
La Belle de nuit.

Réſolutive. Rubeola vulgaris quadrifolia lævis, floribus purpuraſcentibus, *El. Bot.* 106. Rubia Cynanchica, *C. B. P.* 333.
La Petite Garence, ou Herbe à la ſquinancie.

Hiſterique. Valeriana hortenſis Phu, folio oluſatri, *C. B. P.* 164.
La Grande Valeriane.

idem. Valeriana ſylveſtris major, *C. B. P.* 164.
Petite Valeriane ſauvage.

idem. Valeriana paluſtris minor, *C. B. P.* 164.
La Valeriane des Marais.

Rafraichiſſante & épaiſſiſſante. Valerianella Arvenſis præcox, humilis ſemine compreſſo, *Mor. Umb.*
La Maſche, Blanchette, Poulule graſſe, Salade de Chanoine.

SECTION IV.

Des Herbes à fleur en entonnoir, en baſſin, ou en molette, & dont le piſtile eſt compoſé de quatre embrions, qui deviennent autant de ſemences renfermées dans le calice de la fleur.

Bechique. Borrago floribus cæruleis, *J. B.* 3. 574.
La Bourache.

Bugloſſum anguſtifolium majus flore cæruleo, *C. B. P.* 216. — Bechique.
La Bugloſe.

Bugloſſum ſylveſtre minus, *C. B. P.* 256. — idem.
La Bugloſe ſauvage.

Bugloſſum latifolium ſemper virens, *C. B. P.* 256. — idem.
La Bugloſe vivace.

Bugloſſum radice rubrâ, ſive Anchuſa vulgatior, *El. Bot.* 110. — idem.
Anchuſa puniceis floribus, *C. B. P.* 256.
L'Orcanette.

Echium Vulgare, *C. B. P.* 254. — idem.
La Viperine ou Herbe aux Viperes.

Pulmonaria Italorum ad Bugloſſum accedens, *J. B.* 3. 595. — idem.
La Pulmonaire d'Italie.

Pulmonaria rubro flore foliis Echii, *J. B.* 3. 596. — idem.
La Pulmonaire.

Pulmonaria anguſtifolia cæruleo flore, *J. B.* 3. 596. — idem.
La Pulmonaire à feuilles étroites.

Lithoſpermum majus erectum, *C. B. P.* 258. — Aperitive.
Gremille ou Herbe aux perles.

Lithoſpermum minus rectum latifolium, *C. B. P.* 258. — idem.
La Gremille rempante.

Symphytum, Conſolida major, *C. B. P.* 259. — Vulneraire aſtringente.
La Grande Conſoude, Oreille d'Aſne.

Cerinthe quorumdam major verſicolor flore, *J. B.* 3. 602. — Opthalmique.
Le Melinet.

Heliotropium majus Dioſcoridis, *C. B. P.* 253. — Vulneraire deterſive.
L'Herbe aux verues.

Rafraichissante. Cynoglossum majus vulgare, *C. B. P.* 257.
La Langue de Chien.

Vulneraire astringente. Omphalodes pumilla verna symphyti folio, *El. Bot.* 117.
Symphytum minus Borraginis facie, *C. B. P.* 259.
La Petite Bourache, herbe au nombril.

Errhine ou Sternutatoire. Plumbago quorumdam. *Clusii Hist.* 123.
Lepidium Dentellaria dictum, *C. B. P.* 97.
La Dentelaire.

SECTION V.

Des Herbes à fleur en rosette, dont le pistile devient un fruit dur & sec.

Vulneraire astringente. Lysimachia lutea major, quæ Dioscoridis, *C. B. P.* 245.
La Corneil.

Antiscorbutique. Lysimachia humi fusa folio rotundiore, *El. Bot.* 118.
Nummularia major lutea, *C. B. P.* 309.
L'Herbe aux Ecus.

Cephalique. Anagallis phœniceo flore, *C. B. P.* 252.
Le Mouron mâle.

idem. Anagallis cœruleo flore, *C. B. P.* 252.
Le Mouron femelle.

Antiscorbutique. Samolus Valerandi, *J. B.* 3. 792. Anagallis aquatica, folio non crenato, *C. B. P.* 252.
Le Mouron d'eau.

Glaux maritima, *C. B. P.* 215.
Le Glaux.

Veronica

Veronica mas, ſupina, & vulgatiſſima, *C. B. P.* 246. — Vulneraire aperitive.

La Veronique mâle, ou Thée de l'Europe.

Veronica ſupina facie teucrii pratenſis, *Lob. Icon.* 473. — idem.

La Veronique des Prez.

Veronica ſpicata minor, *C. B. P.* 247. — idem.

La Veronique à Epi.

Veronica minor, foliis imis rotundioribus, *Mor. Hiſt. Part.* 2. 220. — idem.

La Veronique des Bois.

Veronica aquatica major, folio ſubrotundo, *Mor. Hiſt.* 323. — idem.

Le Becabunga à feuilles rondes.

Veronica aquatica major, folio oblongo, *Mor. Hiſt. Oxon. Part.* 2. 323. — Antiſcorbutique.

Le Becabunga à feuilles longues.

Cryſoſplenium foliis amplioribus auriculatis, *El. Bot.* 122. Saxifraga rotundi folia aurea, *C. B. P.* 309. — Hepatique.

L'Hepatique dorée.

Verbaſcum mas, latifolium luteum, *C. B. P.* 239. — Emolliente.

Le Bouillon blanc.

Verbaſcum fœmina flore luteo magno, *C. B. P.* 239. — idem.

Le Bouillon blanc femelle.

Blattaria lutea folio longo laciniato, *C. B. P.* 240. — Vulneraire Deterſive.

L'Herbe aux mittes.

SECTION VI.

Des Herbes à fleur, en rosette, ou en godet, dont le pistile devient un fruit mol ou charnu.

Assoupissante. Solanum officinarum acinis nigricantibus, & fuscis, *C. B. P.* 160. Solanum nigrum vulgare, *Cord. Hist.* 158.
La Morelle.

idem. Solanum scandens, seu Dulcamara, *C. B. P.* 167.
La Morelle, Vigne de Judée, ou douce-amere.

idem. Solanum Tuberosum Esculentum, *C. B. P.* 167.
La Pomme de Terre.

idem. Lycopersicon Galeni Anguillare, 217. Solanum pomiferum fructu rotundo striato molli, *C. B. P.* 167.
La Pomme d'amour.

Aperitive. Alkekengi officinarum, *I. R. H.* Solanum Vesicarium, *C. B. P.* 166.
La Coquerele.

Assoupissante. Melongena fructu oblongo, *El. Bot.* 126. Solanum pomiferum fructu oblongo, *C. B. P.* 167.
La Mayene, ou Aubergine.

Errhine, ou Sternutatoire. Capsicum vulgare, *El. Bot.* 127. Piper Indicum vulgatissimum, *C. B. P.* 102.
Le Piment, ou Poivre de Guinée.

Purgative. Cyclamen Orbiculato folio infernè purpurascente, *C. B. P.*
Le Pain de Pourceau.

Moschatellina foliis fumariæ bulbosæ, *I. B.* 3. 206. Ranunculus Nemorosus Muscatellina dictus, *C. B. P.* 178. — Vulneraire detersive.
L'Herbe musquée.

SECTION VII.

Des Herbes à fleur en rosettes, dont le calice devient le fruit.

Pinpinella Sanguisorba minor hirsuta, *C. B. P.* 160. — Vulneraire aperitive.
La Pinpernelle.

CLASSE III.

Des Herbes à fleur d'une seule feuille irréguliere.

SECTION PREMIERE.

Des Herbes à fleur d'une seulle feuille irréguliere, coupée en cornet, ou en capuchon, & dont les jeunes fruits sont attachés au bas du pistile.

ARum vulgare non maculatum, *C. B. P.* 195. — Hepatique.
Le Pied de Veau.

Arum venis albis, *C. B. P.* 195. — idem.
Le Pied de Veau véné en blanc.

Dracunculus Polyphyllus, *C. B. P.* — idem.
La Serpentaire.

SECTION II.

Des Herbes à fleur en tuyau irrégulier, coupé en languette, & dont le calice devient le fruit.

Histerique. Ariſtolochia rotunda flore ex purpureo-nigro, *C. B. P.* 307.
L'Ariſtoloche ronde.

idem. Ariſtolochia longa vera, *C. B. P.* 307.
L'Ariſtoloche longue.

idem. Ariſtolochia Clematitis recta, *C. B. P.* 307.
Ariſtoloche Clematite.

idem. Ariſtolochia Clematitis ſerpens, *C. B. P.* 307.
L'Ariſtoloche petite.

SECTION III.

Des Herbes à fleur en tuyau irrégulier, ouvert par les deux bouts, & dont le piſtile devient le fruit.

Cephalique. Digitalis purpurea, *J. B.* 2. 812.
La Digitale.

Purgative. Digitalis minima, Gratiola dicta, *Mor. Hiſt. Oxon. Part.* 2. 479.
La Gratiolle, ou Herbe à pauvre homme.

Reſolutive. Scrophularia nodoſa fœtida, *C. B. P.* 235.
La Scrophulaire des Bois.

idem. Scrophularia aquatica major, *C. B. P.* 235.
L'Herbe du Siége, ou Betoine d'eau.

Pinguicula Geſneri, *J. B.* 546. Sanicula montana flore calcari donato, *C. B. P.* 243.
La Graſſette.

SECTION IV.

Des Herbes à fleur en tuyau irrégulier, ouvert dans le fond, terminé, & comme formé en devant par un musle à deux machoires.

Antirrhinum vulgare, *J. B.* 3. 462. Le Musle de Veau.	
Linaria vulgaris luteâ flore majore, *C. B. P.* 212. La grande Linaire.	Emolliente.
Linaria cærulea repens, *C. B. P.* 213. La petite Linaire.	idem.
Linaria segetum Nummulariæ folio villoso, *I. R. H.* 252. La Velvotte, Veronique femelle.	Vulneraire aperitive.
Linaria hederaceo folio glabro, seu Cymbalaria, *I. R. H.* 169. La Cimbalaire.	Emolliente.
Euphrasia Officinarum, *C. B. P.* 233. L'Euphraise.	Opthalmique.
Poligala vulgaris, *C. B. P.* 215. Le Poligala.	

SECTION V.

Des Herbes à fleur irréguliere, terminée en bas par un anneau.

Achantus Sativus, vel Mollis Vergilii, *C. B. P.* 383. L'Acante, ou Branche-ursine.	Emolliente.
Acanthus rarioribus & brevioribus aculeis munitus, *I. R. H.* 176. L'Acante sauvage.	idem.

CLASSE IV.

Suite des Herbes à fleur d'une seule feuille irréguliere, que l'on appelle proprement des fleurs en gueule.

SECTION PREMIERE.

Des Herbes à fleur en gueule, dont la lèvre supérieure est en casque, ou en faucille.

Vulneraire detersive. PHlomis fruticosa Salviæ folio, flore luteo, *El. Bot.* 147. Verbascum latis Salviæ foliis, *C. B. P.* 240.
L'Ephlomis, Sauge sauvage.

Stomachique. Horminum comâ purpuro-violaceâ, *J. B.* 3. 309. Horminum sativum, *C. B. P.* 238.
L'Ormin.

Ophtalmique. Sclarea Tab. Ic. 373. Horminum sclarea dictum, *C. B. P.* 238.
La Toute-Bonne, orvale.

idem. Sclarea pratensis, foliis serratis flore cæruleo, *I. R. H.* 179.
La Toute-Bonne des prez.

Cephalique. Salvia major an Sphacelus Theophrasti, *C. B. P.* 237.
La grande Sauge.

idem. Salvia minor aurita & non aurita, *C. B. P.* 237.
La petite Sauge.

idem. Salvia folio tenuiore, *C. B. P.* 237.
La Sauge de Catalogne.

Caſſida paluſtris vulgatior flore cæruleo, *I. H. R.* 182. — Febrifuge.
Tertianaria ou Centaurée bleue, ou la toque.

Brunella major folio non diſſecto, *C. B. P.* 260. — Vulneraire aſtringente.
La Brunelle ou Brunette.

SECTION II.

Des Herbes à fleur en gueule, dont la lévre ſupérieure eſt creuſée en cuilleron.

Lamium vulgare album, ſive Archangelica flore albo, *Park. Theat.* 604. — idem.
L'Ortie morte, ou Ortie blanche.

Moldavica Betonicæ folio flore cæruleo, *I.R.H.* 184. — Hiſterique.
La Meliſſe de Moldavie.

Moldavica Betonicæ folio flore albo, *I. R. H.* 184. Meliſſa peregrina folio oblongo, *C. B. P.* 229. — idem.
Idem.

Balotte, *Math.* 825. Marubium nigrum fœtidum, Balotte Dioſcoridis, *C. B. P.* 230. — idem.
Le Marube noir.

Galeopſis procerior fœtida ſpicata, *I. R. H.* 185. — Réſolutive.
L'Hortie morte des bois.

Galeopſis ſive urtica iners, flore luteo, *J. B.* 3. 323. — Vulneraire aſtringente.
L'Ortie morte à fleurs jaunes.

Galeopſis paluſtris Betonicæ folio, flore variegato, *I. R. H.* 185. Stachis paluſtris fœtida, *C. B. P.* 286. — Réſolutive.
L'Hortie morte des marais.

Stachys major Germanica, *C. B. P.* 236. — Hiſterique.
Le Stachis ou Epy fleuri.

Alexitere & Cordiale. Cardiaca, *J. B.* 3. 320. Marubium Cardiaca dictum fortè, 1. *Theophrasti*, *C. B. P.* 230.
L'Agripaume.

Histerique. Moluca Lævis, *Dod. Pempt.* 92. Melissa moluccana odorata, *C. B. P.* 229.
La Melisse des moluques.

idem. Moluca spinosa, *Dod. Pempt.* 92. Melissa molucana fœtida, *C. B. P.* 229.
La Moluque épineuse.

Cephalique. Pseudodictamnus verticillatus inodorus, *C. B. P.* 222.
Le faux Dictam.

Stomachique. Mentha crispa verticillata, *C. B. P.* 227.
La Menthe frisée.

idem. Mentha angustifolia spicata, *C. B. P.* 227.
La Menthe d'Angleterre.

idem. Mentha hortensis verticillata ocimi odore, *C. B. P.* 227.
La Menthe de jardin.

Histerique. Mentha rotundifolia palustris, seu aquatica major, *C. B. P.* 227.
La Menthe aquatique.

idem. Mentha sylvestris rotundiore folio, *C. B. P.* 227.
La Menthe sauvage, ou Mentastre.

Cephalique. Mentha arvensis verticillata, folio rotundiore odore aromatico, *D. Vernon Ray Synops.* 123.
Le Pouillio-thym.

idem. Mentha aquatica, seu pulegium vulgare, *I. R. H.* 189. Pulegium latifolium, *C. B. P.* 222.
Le Pouliot.

idem. Mentha aquatica satureiæ folio, *I. R. H.* 190.
Pulegium

Pulegium anguſtifolium, *C. B. P.* 222.
Le Pouliot à feuilles étroites.

Lycopus paluſtris villoſus, *I. R. H.* 191. — Vulneraire aſtringente.
Le Marube aquatique.

SECTION III.

Des Herbes à fleur en gueule, dont la lévre ſupérieure eſt retrouſſee.

Sideritis hirſuta procumbens, *C. B. P.* 233. Tetrahit herbaceum, *Lob. Icon.* 523. — Vulneraire deterſive.
La Crapaudine.

Marubium album vulgare, *C. B. P.* 230. — Hiſterique.
Le Marube blanc.

Meliſſa hortenſis, *C. B. P.* 229. — idem.
La Meliſſe citronelle.

Meliſſa humilis latifolia, maximo flore purpuraſcente, *I. R. H.* 193. — Vulneraire aperitive.
La Meliſſe des bois.

Calamintha vulgaris, vel officinarum Germaniæ, *C. B. P.* 228. — Cephalique.
Le Calament.

Calamintha Pulegii odore, ſive Nepeta, *C. B. P.* 228. — idem.
Le Calament à odeur de Pouliot.

Calamintha magno flore, *C. B. P.* 229. — idem.
Le grand Calament de montagne.

Calamintha humilior folio rotundiore, *El. Bot.* 163. Hedera terreſtris vulgaris, *C. B. P.* 306. — Bechique ou Pectorale.
Le Lierre terreſtre.

Clinopodium Origano ſimile, *C. B. P.* 224. — Cephalique.
Le grand Baſilic ſauvage.

Cephalique. Clinopodium Arvenſe ocimi facie, *C. B. P.* 225.
Le petit Baſilic ſauvage.

idem. Roſmarinus hortenſis anguſtiore folio, *C. B. P.* 217.
Le Romarin.

idem. Thymus capitatus qui Dioſcoridis, *C. P. B.* 219.
Le Thim de Crete.

Thymus vulgaris folio latiore, *C. B. P.* 219.
Le Thim à larges feuilles.

idem. Thymus vulgaris folio tenuiore, *C. B. P.* 219.
Le Thim commun.

idem. Serpillum vulgare majus, *C. B. P.* 220.
Le grand Serpolet.

idem. Serpillum vulgare minus, *C. B. P.* 220.
Le petit Serpolet.

idem. Serpillum foliis citrei odore, *C. B. P.* 220.
Le Serpolet citronné.

idem. Satureia ſativa, *J. B.* 3. 272.
La Sariette de jardin.

idem. Satureia montana, *C. B. P.* 218.
La Sariette de montagne.

idem. Thymbra legitima, *Cl. Hiſt.* 358. Satureia cretica, *C. B. P.* 218.
La Sariette de Crete.

idem. Thymbra Sancti Juliani, ſive Satureia vera, *Lob. Icon.* 425.
La Sariette vraye.

idem. Lavandula latifolia, *C. B. P.* 216.
La Lavande, Spic, ou Nard.

idem. Lavandula anguſtifolia, *C. B. P.* 216.
La Lavande femelle.

idem. Lavandula latifolia Indica ſubcinerea ſpicâ bre-

viori, *H. R. Par.* & *El. Bot.* 167.
Lavande d'Eſpagne.

Origanum vulgare ſpontaneum, *J. B.* 3. 236. Cephalique.
L'Origan ſauvage.

Origanum ſylveſtre album, *C. P. B.* 223. idem.
L'Origan à fleurs blanches.

Origanum ſylveſtre humile, *C. B. P.* 223. idem.
Le petit Origan.

Origanum creticum latifolium tomentoſum, ſeu Dictamnus creticus, *El. Bot.* 167. idem.
Dictamnus creticus, *C. B. P.* 222.
Le Dictam de Crete.

Majorana vulgaris, *C. B. P.* 224. idem.
La Marjolaine commune.

Majorana tenuifolia, *C. B. P.* 224. idem.
La Marjolaine gentille.

Majorana rotundifolia ſcutellata, exotica, *H. R. P.* idem.
La Marjolaine annuelle.

Verbena communis cœruleo flore, *C. B. P.* 269. Opthalmique.
La Verveine.

Hyſſopus humilior myrthi-folia, *H. R. P.* Cephalique.
L'Hyſope à larges feuilles.

Hyſſopus officinarum cœrulea ſeu ſpicata, *C. B. P.* 217. idem.
L'Hyſope à feuilles étroites.

Stœchas folio ſerrato, *C. B. P.* 216. idem.
Le Stœchas à feuilles dentelées.

Stœchas purpurea, *C. B. P.* 216. idem.
Le Stœchas à feuilles de Lavande.

Cataria major vulgaris, *El. Bot.* 171. Hiſterique.
Le Nepeta ou Herbe au chat.

Cephalique. Betonica purpurea, *C. B. P.* 305.
La Betoine.

idem. Ocimum vulgatius, *C. B. P.* 226.
Le grand Basilique.

idem. Ocimum minimum, *C. B. P.* 226.
Le petit Basilique.

Section IV.

Des Herbes à fleur en gueule qui n'ont qu'une seule lévre.

Febrifuge. Chamedrys vulgo vera existimata, *J. B.* 3. 288.
La Germandré ou petit Chêne.

Sudorifique & Diaphoretique. Chamedrys palustris canescens, seu scordium officinarum, *El. Bot.* 173. Scordium, *C. B. P.* 247.
La Germandré d'eau, ou Scordium.

idem. Chamedrys fructicosa sylvestris Melissæ folio, *I. R. H.* 205.
Le faux Scordium.

Cephalique. Chamedrys maritima incana frutescens, foliis lanceolatis, *I. R. H.* 205.
Le Marum.

idem. Polium montanum luteum, *C. B. P.* 220.
Le Polium à fleur jaune.

idem. Polium montanum album, *C. B. P.* 221.
Le Polium à fleur blanche.

Vulneraire aperitive. Teucrium Bœticum, *Cl. Hisp.* 229.
Le Teucrium.

idem. Chamæpitys lutea vulgaris, sive folio trifido, *C. B. P.* 249.
L'Ivette.

Chamæpitys moſcata foliis ſerratis an prima Dioſc. *C. B. P.* 249. — Vulneraire aperitive.
L'Ivette muſquée.

Bugula, *Dod. Pempt.* 135.
Conſolida media pratenſis cærulea, *C. B. P.* 260. — Vulneraire aſtringente.
Le Bugle ou petite Conſoude.

Bugula ſylveſtris villoſa flore cæruleo, *I. R. H.* 209. Conſolida media Genevenſis, *J. B.* 3. 432. — idem.
Le Bugle ſauvage.

CLASSE V.

Des Herbes qui ont les fleurs en croix, c'eſt-à-dire, qui ſont compoſées de quatre feuilles diſpoſées en croix.

SECTION PREMIERE.

Des Herbes qui ont leurs fleurs en croix, dont le piſtile devient un fruit aſſez court, & qui n'a qu'une cavité.

ISatis ſativa, vel latifolia, *C. B. P.* 113. — Reſolutive.
Le Paſtel ſauvage.

Crambe maritima braſſicæ folio, *I. R. H.* 211. — Vulneraire deterſive.
Le Choux marin ſauvage d'Angleterre.

SECTION II.

Des Herbes qui ont les fleurs en croix, & dont le piſtile devient un fruit aſſez court, partagé en deux loges par une cloiſon mitoyenne, poſée de travers par le rapport à la ſituation des panneaux du fruit.

Alexirere & Cordiale. Thlaſpi vulgatius, *J. B.* 2. 923.
Le Tlaſpie vulgaire.

idem. Thlaſpi allium redolens, *Mor. Hiſt.* 297.
Le Thlaſpi à odeur d'ail.

idem. Thlaſpi roſa de hierico dictum Moriſoni, *Hiſt. Oxon. Part.* 2. 328.
La Roſe de Jerico.

idem. Thlaſpi cum ſiliquis latis, *J. B.* 2. 923.
Le Thlaſpi à large ſilique.

Antiſcorbutique. Naſturtium hortenſe vulgatum, *C. B. P.* 103.
Le Creſſon Alenois ou Naſitor.

idem. Naſturtium ſylveſtre capſulis criſtatis, *I. R. H.* 214. Ambroſia campeſtris repens, *C. B. P.* 138.
L'Ambroſie ſauvage.

idem. Cochlearia folio ſubrotundo, *C. B. P.* 110.
L'Herbe aux Cuillieres.

idem. Cochlearia folio cubitali, *I. R. H.* 215.
Le Raifort ſauvage.

idem. Lepidium latifolium, *C. B. P.* 97.
La grande Paſſerage.

idem. Lepidium gramineo folio, ſive Iberis, *El. Bot.* 184.
La petite Paſſerage.

Bursa Pastoris major folio sinuato, *C. B. P.* 108. Febrifuge.
Le Tabouret ou Bourse à Berger.

Section III.

Des Herbes qui ont les fleurs en croix, dont le pistile devient un fruit divisé en deux loges par une cloison mitoyenne, parallele aux panneaux de ce fruit.

Alysson incanum montanum luteum, *El. Bot.* 186. Aperitive.
L'Alisson vivace des montagnes.

Lunaria major siliquâ rotundiore, *J. B.* 2. 881. Vulneraire Aperitive.
La grande Lunaire, ou Bulbonac.

Lunária Leucoii folio siliquâ oblongâ majore, *I. R. H.* 218. idem.
La petite Lunaire.

Section IV.

Des Herbes qui ont les fleurs en croix, dont le pistile devient une gousse divisée dans sa longueur en deux loges par une cloison mitoyenne.

Brassica capitata alba. *C. B. P.* 111. Bechique.
Le Choux blanc pommé.

Brassica capitata rubra, *C. B. P.* 111. idem.
Le Choux rouge.

Leucoium luteum vulgare, *C. B. P.* 202. Histerique.
La Giroflée jaune.

Hesperis allium redolens, *Mor. Hist.* 252. Alliaria, *Math.* 843. Vulneraire deterfive.
L'Alliaire.

Antiſcorbutique. Heſperis hortenſis, *C. B. P.* 202.
La Julienne.

idem. Cardamine pratenſis magno flore purpuraſcente, *I. R. H.* 224.
Le Creſſon des prés.

idem. Cakile maritimâ ampliore folio, *I. R. H. Cor.* 49.
Cakile.

Vulneraire deterſive. Dentaria Heptaphyllos, *C. B. P.* 322.
La Dentaire.

Antiſcorbutique. Siſymbrium erucæ folio flore luteo, *El. Bot.* 192. Eruca lutea latifolia, ſive Barbarea, *C. B. P.* 98.
L'Herbe de Sainte Barbe.

idem. Siſymbrium aquaticum, *Math.* 487.
Le Creſſon de Fontaine.

idem. Siſymbrium aquaticum Raphani folio ſiliquâ breviori, *El. Bot.* 192. Raphanus aquaticus alter, *C. B. P.* 67.
Le Raifort aquatique.

idem. Siſymbrium aquaticum foliis in profundas lacinias diviſis ſiliquâ breviori, *El. Bot.* 193.
Le Creſſon à fleurs jaunes.

Vulneraire aſtringente. Siſymbrium Annuum Abſinthii minoris folio, *I. R. H.* 226. Thalictrum, *Dod. Lugd.* 1146. Sophia Chirurgorum, *Lob. Icon.* 738.
Le Talictron.

Antiſcorbutique. Eruca latifolia alba ſativa, *Dioſc. C. B. P.* 98.
La Roquette de Jardin.

idem. Eruca tenuifolia perennis, flore luteo, *J. B.* 2. 861.
La Roquette ſauvage.

Sinapi

Sinapi Rapi folio, *C. B. P.* 99. — Sternutatoire.
La Moutarde, Senevé.

Sinapi Apii folio, *C. B. P.* 99. — idem.
La Moutarde sauvage.

Erysimum vulgare, *C. B. P.* 100. — Bechique.
Le Velar, Tortele.

Erysimum latifolium majus glabrum, *C. B. P.* 101. — idem.
Le Velar, Herbe au Chantre. — idem.

Rapa sativa rotunda, *C. B. P.* 89.
La Rave blanche.

Rapa sativa oblonga sive fœmina, *C. B. P.* 89. — Aperitive.
La Rave rouge, ou d'Amiens.

Napus sativa radice albâ, *C. B. P.* 95. — Bechique.
Le Navet ordinaire.

Napus sylvestris, *C. B. P.*
Le Navet sauvage.

Raphanus major orbicularis, vel rotundus, *C. B. P.* 96. — Aperitive.
Le gros Radix.

Raphanus niger, *C. B. P.* 96. — idem.
Le petit Radix.

SECTION V.

Des Herbes qui ont les fleurs en croix, & dont le pistile devient une gousse divisée en travers en plusieurs loges.

Hypecoon latiore folio, *I. R. H.* 230. — Assoupissante.
L'Hypecoon.

SECTION VI.

Des Herbes qui ont les fleurs en croix, dont le pistile devient une gousse qui n'a qu'une cavité.

Opthalmique. Chelidonium majus vulgare, *C. B. P.* 144.
L'Eclaire, Chelidoine, Felougene.

Rafraichissante. Epimedium, *Dod. Pempt.* 599.
L'Epimedium.

SECTION VII.

Des Herbes qui ont les fleurs en croix, dont le pistile devient un fruit à trois ou quatre cellules.

Errhyne, ou Sternutatoire. Erucago Segetum, *El. Bot.* 199. Eruca Monspeliaca siliquâ quadrangulâ echinatâ, *C. B. P.* 99.
La Roquette des champs.

SECTION VIII.

Des Herbes qui ont les fleurs en croix, & les semences ramassées en maniere de tête.

Potamogeton foliis pennatis, *El. Bot.* 200. Millefolium aquaticum pennatum spicatum, *C. B. P.* 141.

SECTION IX.

Des Herbes qui ont les fleurs en croix, & le fruit moû.

Herba Paris, *Dod. Pempt.* 444. — Alexitere & Cordiale.
Le Raisin de Renard.

CLASSE VI.

Des Herbes dont les fleurs sont composées de plusieurs feuilles disposées en rose.

SECTION PREMIERE.

Des Herbes à fleur en rose, dont le pistile devient un fruit qui s'ouvre en travers comme une boëte.

AMaranthus maximus, *C. B. P.* 120. — Vulneraire astringente.
L'Amarante.

Portulaca latifolia seu sativa, *C. B. P.* 288. — Rafraichissante.
Le Pourpier ordinaire.

Portulaca angustifolia, sive sylvestris, *C. B. P.* 288. — idem.
Le Pourpier sauvage.

SECTION II.

Des Herbes à fleur en rose, dont le pistile ou le calice devient un fruit assez gros, & qui n'a qu'une cavité.

Papaver hortense semine albo, sativum Dioscoridis, album Plinii, *C. B. P.* 170. — Assoupissante.
Le Pavot blanc.

Assoupissante. Papaver hortense nigro semine, sylvestre Dioscoridis, nigrum Plinii, *C. B. P.* 170.
Le Pavot noir.

Bechique. Papaver Erraticum majus, Diosc. Theophrasti, Plinii, *C. B. P.* 171.
Le Pavot rouge, ou Coquelicot.

Assoupissante. Argemone Mexicana, *El. Bot.* 204. Papaver spinosum, *C. B. Prod.* 92.
Le Pavot du Mexique, ou Chardon béni des Americains.

Opuntia vulgò herbariorum, *J. B.* 1. 154.
Le Figuier d'Inde.

Granadilla Polyphyllos fructu ovato, *I. R. H.* 241.
La Fleur de la Passion.

SECTION III.

Des Herbes à fleur en rose, dont le pistile devient un fruit assez petit, & qui n'a qu'une cavité.

Rafraichissante. Alsine media, *C. B. P.* 250.
La Morgeline, ou Mouron.

Myosotis incana repens, *El. Bot.* 211.
L'Oreille de Souris.

Bechique. Ros Solis folio rotundo, *C. B. P.* 357.
Rosée du Soleil.

Vulneraire Deterfive. Kaly spinosum foliis longioribus & angustioribus *I. R. H.* 247. Tragon Mathioli, *Lob. Icon.* 797.
La Soude.

Thelephium Dioscoridis Imperati, 66
Le Thelephium.

Camphorata hirſuta, *C. B. P.* — Aperitive.
Camphrée.

Helianthemum vulgare flore luteo. *J. B.* 2. 15. — Vulneraire aperitive.
La Fleur du Soleil, Hyſſope de Garic.

Androſemum maximum fruteſcens, *C. B. P.* 280. — idem.
La Toute-Saine.

SECTION IV.

Des Herbes à fleur en roſe, dont le piſtile devient un fruit diviſé le plus ſouvent en deux loges.

Geum rotundifolium majus, *El. Bot.* 218. Sanicula montana rotundifolia major, *C. B. P.* 243. — Aperitive.
Le Geum, ou petit Sanicle de montagne.

Saxifraga rotundifolia alba, *C. B. P.* 309. — idem.
La Saxifrage.

Salicaria vulgaris purpurea foliis oblongis, *El. Bot.* 220. — Vulneraire aſtringente.
La Salicaire.

Glautium flore luteo, *El. Bot.* 221. Papaver Corniculatum luteum, *J. B.* 3. 398. — Aperitive.
Le Pavot cornu.

SECTION V.

Des Herbes à fleur en roſe, dont le piſtile devient un fruit diviſé en cellules.

Hypericum vulgare, *C. B. P.* 279. — Vulneraire aperitive.
Le Millepertuis.

Aſcyrum magno flore, *C. B. Prod.* 130.
L'Aſcyrum.

Vulneraire aſtringente. Pyrola rotundifolia major, *C. B. P.* 191.
La Pyrole.

Hiſterique. Ruta hortenſis latifolia, *C. B. P.* 336.
La Ruë de jardin.

idem. Harmala, *Dod. Pempt.* 121. Ruta ſylveſtris flore magno albo, *C. B. P.* 336.
La Ruë ſauvage.

Aperitive. Nigella Arvenſis cornuta, *C. B. P.* 145.
La Nigelle Romaine.

idem. Nigella Cretica, *C. B. P.* 146.
La Nigelle de Crete.

Fabago Belgarum, ſive Peplus Pariſienſium, *Lugd.* 456. Capparis Portulacæ folio, *C. B. P.* 480.
Le Fabago.

Vulneraire aſtringente. Cyſtus Ladanifera Hiſpanica Salicis folio, *El. Bot.* 227.
Le Ciſte qui porte le Ladanum.

idem. Cyſtus Ladanifera Monſpelienſium, *C. B. P.* 467.
Le Ciſte de Montpellier.

Rafraichiſſante. Nymphæa alba major, *C. B. P.* 193.
Le Nenufar, Lis d'étang à fleur blanche.

idem. Nymphæa lutea major, *C. B. P.* 191.
Le Lis d'étang à fleur jaune.

SECTION VI.

Des Herbes à fleur en roſe, dont le piſtile devient un fruit qui dans ſon épaiſſeur renferme pluſieurs ſemences.

Capparis ſpinoſa fructu minore folio rotundo, *C. B. P.* 480. — Aperitive.
Le Caprier.

SECTION VII.

Des Herbes à fleur en roſe, dont le piſtile devient un fruit compoſé de pluſieurs piéces.

Sedum majus vulgare, *C. B. P.* 283. — Rafraichiſſante.
La grande Joubarbe.

Sedum minus, teretifolium album, *C. B. P.* 283. — idem.
La petite Joubarbe.

Sedum parvum acre flore luteo, *J. B.* 3. 694. — Reſolutive.
La Vermiculaire brûlante.

Anacampſeros, vulgò Faba craſſa, *J. B.* 3. 681. — Vulneraire aſtringente.
L'Orpin, ou Repriſe.

Anacampſeros radice Roſam-ſpirante major, *I. R. H.* 264. Rodia Radix, *C. B. P.* 286. — Cephalique.
L'Orpin-Roſe.

Ulmaria Cluſii, *Hiſt.* 198. Barba Capræ floribus compactis, *C. B. P.* 768. — Diaphoretique & Sudorifique.
La Reine des Prez.

Barba Capræ floribus oblongis, *C. B. P.* 163. — idem.
La Barbe de Chévre.

Apéritive. Tribulus terreſtris ciceris folio fructu aculeato, *C. B. P.* 350.
La Croix de Chevalier.

Vulneraire aſtringente. Geranium ſanguineum maximo flore, *C. B. P.* 318.
Le Bec de Grüe.

idem. Geranium Robertianum 1. Viride, *C. B. P.* 319. Geranium Robertianum murale, *J. B.* 3. 480.
L'Herbe à Robert.

idem. Geranium folio malvæ rotundo, *C. B. P.* 318. Geranium folio rotundo multum ſerrato, ſive Columbinum, *J. B.* 3. 473. Pes Columbinum, *Dod. Pempt.* 61.
Le Pied de Pigeon.

idem. Geranium cicutæ folio, moſchatum, *C. P. B.* 319. Geranium ſupinum, *Dod. Pempt.* 63.
Le Geranium muſqué.

Vulneraire apéritive. Talictrum majus ſiliquâ angulosâ, aut ſtriatâ, *C. B. P.* 336.
La Rue des prez.

Purgative. Helleborus niger fœtidus, *C. B. P.* 185.
L'Ellebore noir, pied de Griſon.

idem. Helleborus niger hortenſis flore roſeo, *C. B. P.* 186.
L'Ellebore noir des jardins.

idem. Helleborus niger hortenſis flore viridi, *C. B. P.* 185.
L'Ellebore noir à fleur verte.

idem. Veratrum flore atro-rubente, *El. Bot.* 237.
L'Ellebore blanc à fleur rouge.

idem. Veratrum flore ſubviridi, *El. Bot.* 237.
L'Ellebore à fleur verte.

Populago

Populago flore majore, *I. R. H.* 273. Caltha palustris flore simplici, *C. B. P.* 276.
Le Souci d'eau.

Pœonia folio nigricante splendido quæ mas, *C. B. P.* 323. — Cephalique.
La Pivoine mâle.

Pœonia communis, vel fœmina, *C. B. P.* 323. — idem.
La Pivoine femelle.

SECTION VIII.

Des Herbes à fleur en rose, dont le pistile devient un fruit composé de plusieurs graines ramassées en maniere de tête.

Anemone sylvestris alba major, *C. B. P.* 176. — Vulneraire detersive.
L'Anemone sauvage.

Pulsatilla folio crassiore & majore flore, *C. B. P.* 177. — Errhyne ou Sternutatoire.
La Coquelourde, herbe au vent.

Ranunculus pratensis radice verticilli modo rotundâ, *C. B. P.* 179. — Vulneraire Detersive.
La Renoncule tubereuse.

Ranunculus phragmites albus & purpureus vernus, *J. B.* 3. 412. — idem.
La Renoncule des bois.

Ranunculus pratensis repens, hirsutus, *C. B. P.* 175. — idem.
La Grenouillette.

Ranunculus palustris apii folio lævis, *C. B. P.* 180. — idem.
La Renoncule des marais.

Ranunculus vernus minor rotundifolius, *I. R. H.* 286. Scrophularia minor, sive Chelido- — Résolutive.

nium minus vulgo dictum, *J. B.* 3. 468.
La petite Chelidoine.

Hepatique. Ranunculus tridentatus vernus, *El. Bot.* 241.
Trifolium hepaticum flore ſimplici, *C. B. P.* 330.
L'Hepatique des jardins.

Apéritive. Filipendula vulgaris, An Molon. Plinii, *C. B. P.* 163.
La Filipendule.

Vulneraire deterſive. Clematitis ſylveſtris latifolia, *C. B. P.* 300.
La Viorne, herbe au gueux.

Febrifuge. Cariophyllata vulgaris, *C. B. P.* 321.
La Benoite.

Apéritive. Fragaria vulgaris, *C. B. P.* 326.
Le Fraiſier.

Vulneraire aſtringente. Quinquefolium majus repens, *C. B. P.* 325.
La Quintefeuille.

idem. Tormentilla ſylveſtris, *C. B. P.* 326.
La Tormentille.

Febrifuge. Penthaphylloides argenteum alatum, ſeu Potentilla, *I. R. H.* 298.
L'Argentine.

SECTION IX.

Des Herbes à fleur en roſe, dont le piſtile ou le calice deviennent des fruits moûs.

Chryſtophoriana vulgaris noſtras racemoſa, & ramoſa, *Mor. Hiſt.* 8. Aconitum racemoſum, an Actæa Plinii, *C. B. P.* 183.
L'Herbe de S. Chryſtophle.

Aſſoupiſſante. Phytolaca Americana, *El. Bot.* 249. Solanum racemoſum Indicum, *H. R. P.*
Le Raiſin d'Amerique.

Aralia Canadensis, *I. R. H.* 249. Panaces, sive recemosa Canadensis cornuti, 74.
L'Aralia du Canada.

Asparagus sativa, *C. B. P.* 489. — Aperitive.
L'Asperge.

Asparagus sylvestris tenuissimo folio, *C. B. P.* 490. — idem.
L'Asperge sauvage.

Section X.

Des Herbes à fleur en rose, dont le calice devient le fruit ou la graine.

Cuminoides vulgare, *El. Bot.* 250. Cuminum sylvestre capitulis globosis, *C. B. P.* 146. — Carminative.
Le Cumin sauvage.

Circæa Lutetiana, *Lob. Icon.* 266. Solanifolia Circæa dicta major, *C. B. P.* 168. — Resolutive.
L'Herbe de S. Etienne.

Agrimonia, seu Eupatorium, *J. B.* 2. 398. — Hepatique.
L'Aigremoine.

Agrimonia odorata, *Cam. Hort. El. Bot.* 251. Eupatorium odoratum, *C. B. P.* 321. — idem.
L'Aigremoine odorante.

Onagra latifolia, *El. Bot.* 252. Lysimachia lutea corniculata, *C. B. P.* 245.
L'Onagra.

Chamænerion latifolium vulgare, *El. Bot.* 252. Lysimachia Chamænerion dicta latifolia, *C. B. P.* 245. — Vulneraire detersive.
Le petit Laurier rose, ou Herbe de S. Antoine.

CLASSE VII.

Suite des Herbes à fleur en roſe, ſçavoir des fleurs en paraſol ou en ombelle.

Section Premiere.

Des Herbes à fleur en paraſol ſoutenues par des rayons, & dont le calice devient un fruit à deux petites graines cannelées ou rayées.

Carminative. — AMmi majus, *C. B. P.* 159.
L'Ammi.

Aperitive. — Apium hortenſe, ſeu Petroſelinum vulgò.
Le Perſil commun.

idem. — Apium dulce Celeri Italorum, *H. R. Par.*
Le Celeri.

idem. — Apium paluſtre & Apium officinarum, *C. B. P.* 154.
L'Ache.

idem. — Apium Macedonicum, *C. B. P.* 154.
Le Perſil de Macedoine.

Carminative. — Apium & Aniſum dictum ſemine ſuaveolente majori, *I. R. H.* 305.
L'Anis.

Apium Pirenaicum tapſiæ facie, *I. R. H.* 305.

Aſſoupiſſante. — Cicuta major, *C. B. P.* 160.
La grande Ciguë.

idem. — Carvi Ceſalpini, 291. Cuminum pratenſe Carvi officinarum, *C. B. P.* 158.
Le Carvi des prez.

Bulbocaſtanum majus folio Apii, *C. B. P.* 162. La Terre noix.	Vulneraire aſtringente.
Daucus ſativus radice luteâ vel albâ, *El. Bot.* 257. La Carotte.	Carminative.
Daucus vulgaris Cluſii, *Hiſt.* 198. La Carotte ſauvage.	idem.
Sium ſive Apium paluſtre foliis oblongis, *C. B. P.* 154. La Berle ou Ache d'eau.	Antiſcorbutique.
Sium Aromaticum, Siſon officinarum, *I. R. H.* 308. Siſon ſive officinarum Amomum, *J. B.* 3. *Part.* 2. 107. Le Siſon ou Amome.	Carminative.
Siſarum Germanorum, *C. B. P.* 155. Le Cherüi.	Aperitive.
Tragoſelinum majus umbellâ candidâ, *El. Bot.* 259. Pinpinella ſaxifraga major umbellâ candidâ, *C. B. P.* 159. Le Boucage, ou Perſil de bouc.	idem.
Tragoſelinum minus, *El. Bot.* 259. Pinpinellâ Saxifraga minor, *C. B. P.* 160. La petite Saxifrage des montagnes.	idem.
Buplevrum arboreſcens ſalicis folio, *El. Bot.* 260. Seſeli Ethiopicum ſalicis folio, *C. B. P.* 161. Le Seſeli d'Ethiopie.	
Buplevrum perfoliatum rotundifolium annuum, *I. R. H.* 300. Le Perceſeuille annuel.	Vulneraire aſtringente.
Buplevrum folio ſubrotundo, ſive vulgatiſſimum, *C. B. P.* 309. L'Oreille de Liévre.	Errhyne, ou Sternutatoire.

SECTION II.

Des Herbes à fleur en parasol soutenues par des rayons, & dont le calice devient un fruit à deux graines étroites, longues & de médiocre grosseur.

Aperitive. Fœniculum vulgare minus acriori & nigriori semine, *J. B.* 3. *Part.* 2. *alt.* 2.
Le Fenouil commun.

idem. Fœniculum dulce majore & albo semine, *J. B.* 3. *Part. alt.* 4.
Le Fenouil doux.

Carminative. Fœniculum tortuosum, *J. B.* 3. *Part. alt.* 16. Seseli Massiliense fœniculi folio quod Dioscoridis censetur, *C. B. P.* 161.
Le Seseli de Marseille.

Histerique. Meum foliis anethi, *C. B. P.* 148.
Le Meum.

Carminative. Oënanthe apii folio, *C. B. P.* 162.
Le Persil de marais.

idem. Angelica montana perennis paludapii folio, *El. Bot.* 262. Ligusticum vulgare, An Libanotis fertilis Theophrasti, *C. B. P.* 157.
La Levesche ou Ache de montagne.

Aperitive. Angelica pratensis apii folio, *I. R. H.* 313. Seseli pratense Silanus fortè Plinii, *C. B. P.* 162.
La Saxifrage des Anglois.

Vulneraire astringente. Astrantia major, *Mor. umb.* 7. Helleborus niger Saniculæ folio major, *C. B. P.* 186.
La Sanicle femelle.

Hepatique. Chœrophillum sativum, *C. B. P.* 152.
Le Cerfeuil.

Chœrophillum ſylveſtre perenne cicutæ folio, *El. Bot.* 264. — Hepatique.
Le Cerfeuil ſauvage.

Myrrhis major, vel cicutaria odorata, *C. B. P.* 160. — idem.
Le Cerfeuil muſqué, ou d'Eſpagne.

SECTION III.

Des Herbes à fleur en paraſol ſoutenues par des rayons, & dont le calice devient un fruit à deux graines preſque rondes & de médiocre groſſeur.

Smyrnium Mathioli, *Icon. Valgr.* 773. Hippoſelinum Theophraſti, vel Smyrnium Dioſc. *C. B. P.* 154. — Aperitive.
Le gros Perſil de Macedoine.

Coriandrum majus, *C. B. P.* 158. — Carminative.
La Coriandre.

SECTION IV.

Des Herbes à fleur en paraſol ſoutenues par des rayons, & dont le calice devient un fruit à deux graines ovales, plattes & de médiocre groſſeur.

Imperatoria major, *C. B. P.* 156. — Diaphoretique & Sudorifique.
Le Benjoin François, ou Imperatoire.

Imperatoria ſativa, *I. R. H.* 317. Angelica ſativa, *C. B. P.* 155. — idem.
L'Angelique de Bohême, ou de jardin.

Imperatoria pratenſis major, *I. R. H.* 317. Angelica ſylveſtris major, *C. B. P.* 155. — idem.
L'Angelique ſauvage.

Diaphoretique & Sudorifique. Imperatoria lucida Canadensis, *El. Bot.* 267.
Angelica lucida Canadensis, *Corn.* 197.
L'Angelique de Canada.

Aperitive. Chrithmum, sive Fœniculum maritimum majus odore apii, *C. B. P.* 288.
La Passe Pierre Fenouil marin, Bacile, Herbe de S. Pierre.

Carminative. Anethum hortense, *C. B. P.* 147.
L'Anet.

Peucedanum majus Italicum, *C. B. P.* 149.
La Queüe de Pourceau d'Italie.

Bechique. Peucedanum germanicum, *C. B. P.* 149.
La Queüe de Pourceau,

SECTION V.

Des Herbes à fleur en parasol soutenues par des rayons, dont le calice devient un fruit a deux graines ovales, plattes & d'une grandeur considérable.

Aperitive. Oreoselinum apii folio majus, *I. R. H.* 318.
Le grand Persil de montagne.

idem. Oreoselinum apii folio minus, *I. R. H.* 318.
Le petit Persil de montagne.

Errhyne ou Sternutatoire. Thyselinum palustre, *I. R. H.* 319.
Le Persil de marais.

Carminative. Pastinaca sativa latifolia, *C. B. P.* 133.
Le Panais, ou Pastenade.

idem. Pastinaca sylvestris latifolia, *C. B. P.* 155.
Le Panais sauvage.

Emolliente. Sphondillium vulgare hirsutum, *C. B. P.* 157.
Le Berce fausse, Branc-Ursine.

Sphondillium

Spondylium majus, ſive Panax Heracleum quibuſdam, *J. B.* 3. *Part.* 2. 161. — Emolliente.
Le Panax.

Tordylium Narbonenſe minus, *I. R. H.* 320. Seſeli Creticum, *Dod. Pempt.* 314. — Carminative.
Le Seſeli de Candie.

Ferula galbanifera, *Lob. Icon.* 779. — Hiſterique.
La Ferule.

Tapſia maxima latiſſimo folio, *C. B. P.* 148. — Purgative.
Le Turbith.

Tapſia latifolia villoſa, *C. B. P.* 148. — idem.
Le Turbith.

Cicutaria latifolia fœtida, *C. B. P.* 161.
La Cicutaire.

Caucalis Arvenſis Echinata magno flore, *C. B. P.* 152. — Aperitive.
Le Caucalis.

Liguſticum quod Seſeli officinarum, *C. B. P.* 162. — Carminative.
Le Seſeli commun.

Liguſticum Alpinum multifido longoque folio, *I. R. H.* 324. Daucus Creticus, *Camer. Epit.* — idem.
Le Daucus de Candie.

Liguſticum cicutæ folio glabrum, *El. Bot.* 274. Seſeli montanum cicutæ folio glabrum, *C. B. P.* 150.
Le Seſeli de montagne.

Laſerpitium foliis latioribus lobatis, *Mor. Umb.* 29.
Le Laſerpitium.

SECTION VII.

Des Herbes à fleurs en parasol, soutenuës par des rayons, & dont le calice devient un fruit à deux graines envelopées d'une matiére spongieuse.

Cachris semine fungoso lævi foliis ferulaceis, *Mor. Umb.* 62.
L'Amarinthe.

SECTION VIII.

Des Herbes à fleurs en parasol, soutenues par des rayons, & dont le calice devient un fruit à deux graines terminées par une longue queuë.

Vulneraire aperitive. Scandix semine rostrato vulgaris, *C. B. P.* 152.
Pecten Veneris, *J. B.* 3. *Part.* 2. 71.
Aiguille, ou Peigne de Venus.

SECTION IX.

Des Herbes à fleurs en parasol, ramassées en maniere de tête, & dont les fleurs ne sont soutenues par aucun rayon.

Vulneraire astringente. Sanicula officinarum, *C. B. P.* 329.
La Sanicle.

Aperitive. Eringium vulgare, *C. B. P.* 386.
Le Chardon Roland, Panicaut, Chardon à cent têtes.

idem. Eringium Maritimum, *C. B. P.* 386.
Le Panicaut Marin.

Hydrocotyle vulgaris, *El. Bot.* 278. Ranunculus aquaticus Cotyledonis folio, *C. B. P.* 180. — Vulneraire deterſive.
L'Ecuelle d'eau.

CLASSE VIII.

Des Herbes à fleurs régulieres, compoſées de pluſieurs feuilles diſpoſées en œillet.

SECTION PREMIERE.

Des Herbes à fleur en œillet, dont le piſtile devient le fruit.

CAryophillus altilis major, *C. B. P.* 207. — Alexitaire & cordiale.
L'Œillet ſimple.

Lichnis ſylveſtris alba ſimplex, *C. P. B.* 204. — Cephalique.
Le Lichnis ſauvage.

Lichnis ſylveſtris quæ Behen album vulgò, *C. B. P.* 205. — Vulneraire deterſive.
Le Behen blanc.

Lichnis ſegetum major, *C. B. P.* 204.
La Nielle des Bleds.

Lichnis ſylveſtris quæ Saponaria vulgò, *El. Bot.* 281. Saponaria major lævis, *C. B. P.* 206. — Vulneraire deterſive.
La Saponaire, ou Savoniere.

Linum ſativum, *C. B. P.* 214. — Emolliente.
Le Lin commun.

Linum pratenſe floſculis exiguis, *C. B. P.* 214. — Purgative.
Le Lin ſauvage.

SECTION II.

Des Herbes à fleur en œillet, dont le pistile devient une graine renfermée dans le calice de la fleur.

Vulneraire astringente. Statice, *Lugd.* 1190. Caryophillus montanus major flore globoso, *C. B. P.* 211.
L'Herbe à sept tiges.

Vulneraire aperitive. Limonium maritimum majus, *C. B. P.* 192.
Le Behen rouge.

CLASSE IX.

Des Herbes dont les fleurs approchent en quelque maniere de la fleur du lys, & qu'on appellera dans la suite des fleurs en lys.

SECTION PREMIERE.

Des Herbes à fleur en lys d'une seule feuille coupée en six piéces, dont le pistile devient le fruit.

Histerique. Asphodelus albus ramosus mas, *C. B. P.* 28.
L'Asphodele Royal.

Asphodelus spiralis luteus Italicus flore magno, *H. R. P.*
L'Asphodele d'Italie.

Purgative. Colchicum commune, *C. B. P.* 67.
Le Colchique, Tue-chien.

SECTION II.

Des Herbes à fleur en lys d'une ſeule feuille coupée en ſix piéces, & dont le calice devient le fruit.

Crocus ſativus, *C. B. P.* 65. Le Safran.	Hiſterique.
Narciſſus Illiricus liliaceus. *C. B. P.* 55. Le Narciſſe de Mathiole, ou Pancraticum.	
Iris vulgaris Germanica, ſive ſylveſtris, *C. B. P.* 30. La Flambe, ou Iris.	Purgative.
Iris alba Florentina, *C. B. P.* 31. L'Iris de Florence.	idem.
Iris paluſtris lutea, *Taber. Icon.* 643. Acorus adulterinus, *C. B. P.* 34. L'Iris jaune des prez.	Vulneraire aſtringente.
Iris fœtidiſſima, ſeu Xiris, *I. R. H.* 360. Le Glayeul puant.	Hiſterique.
Gladiolus floribus uno verſu diſpoſitis, *C. B. P.* 41. Le Glayeul.	Emolliente.
Hermodactylus, folio quadrangulo, *Corrol. I. R. H.* 50. Iris tuberoſa folio anguloſo, *C. B. P.* 40. L'Hermodatte.	Purgative.
Aloe vulgaris, *C. B. P.* 286. L'Aloës commun.	idem.
Aloe Africana caulefcens, foliis ſpinoſis, maculis ab utrâque parte albicantibus notatis, *Hort. Amſt.* 2. 9. L'Aloës maculé.	idem.

Aloe ſuccotorina, anguſtifolia ſpinoſa, flore purpureo, *Breyn. Podr. 2. H. Amſtel. in-fol.* 91.

L'Aloës ſuccotrin.

Cannacorus latifolius vulgaris, *El. Bot.* 295. Arundo Indica florida, Cannacorus quorumdam, *Lob. Icon.* 56.

La Canne d'Inde, ou Baliſier.

SECTION III.

Des Herbes à fleurs en lys compoſées de trois feuilles.

Ephemerum virginianum flore cæruleo, *El. Bot.* 295.

L'Ephemerum.

SECTION IV.

Des Herbes à fleurs en lys compoſées de ſix feuilles, & dont le piſtile devient le fruit.

Emolliente. Lilium album vulgare, *J. B.* 2. 685.

Le Lys.

idem. Corona Imperialis, *Dod. Pempt.* 202.

La Couronne Imperiale.

Alexitaire, ou cordiale. Ornitogalum maritimum, ſeu Scilla radice rubrâ, *El. Bot.* 302. Scilla vulgaris radice rubrâ, *C. B. P.*

La Scille rouge.

idem. Ornitogalum maritimum, ſeu Scilla radice albâ, *El. Bot.* 302. Scilla radice albâ, *C. B. P.* 71.

La Scille blanche.

Porrum commune capitatum, *C. B. P.* 72. Le Poireau commun.	Alexitaire ou cordiale.
Porrum ſylveſtre vinearum, *C. B. P.* 72. Le Poireau ſauvage.	idem.
Cepa vulgaris, *C. B. P.* 71. L'Oignon.	idem.
Cepa fiſſilis Mathioli, *Lugd.* 1539. La Ciboule.	idem.
Cepa Aſcalonica, *Math.* 556. L'Eſchalotte.	idem.
Cepa Alpina paluſtris tenuifolia, *El. Bot.* 304. La Civette des Alpes.	idem.
Allium ſativum, *C. B. P.* 73. L'Ail.	idem.
Allium ſylveſtre latifolium, *C. B. P.* 74. L'Ail ſauvage.	idem.

SECTION V.

Des Herbes à fleurs en lys compoſées de ſix feuilles, & dont le calice devient le fruit.

Lilio-Narciſſus.

CLASSE X.

Des Herbes à fleurs irrégulieres, composées de plusieurs feuilles, & qu'on appelle ordinairement des Fleurs légumineuses.

SECTION PREMIERE.

Des Herbes à fleurs légumineuses, dont le pistile devient une gousse simple & assez courte.

Bechique.	GLyzyrrhyza Siliquosa vel Germanica, *C. B. P.* 352. La Reglisse ordinaire.
idem.	Glyzyrrhyza capite echinato, *C. B. P.* 352. La Reglisse.
Aperitive.	Cicer sativum, *C. B. P.* 347. Le Pois-chiche blanc.
idem.	Cicer arieticum fructu nigro, *Mor. H. R. B.* Le Pois-chiche rouge.
Resolutive.	Lens vulgaris, *C. B. P.* 346. La Lentille.
idem.	Onobrychis foliis viciæ fructu echinato major, *C. B. P.* 350. Le Sainfoin ordinaire.
Vulneraire aperitive.	Vulneraria rustica, *J. B.* 2. 362. La Vulneraire rustique.

SECTION

SECTION II.

Des Herbes à fleurs légumineuses, dont le pistile devient une gousse simple & longue.

Faba flore candido lituris nigris conspicuis, *C. B. P.* 338. La Féve de marais.	Resolutive,
Faba minor, sive Equina, *C. B. P.* 338. La Féverolle.	idem.
Lupinus sativus flore albo, *C. B. P.* 347. Le Lupin.	idem.
Orobus sylvaticus purpureus vernus, *C. B. P.* 351. L'Orobe.	idem.
Pisum hortense majus flore fructuque albo, *C. B. P.* 342. Le Pois.	idem,
Lathyrus sylvestris flore fructuque albo, *C. B. P.* 343. La Gesse.	idem,
Ochrus folio integro capreolos emittente, *C. B. P.* 343. L'Ocre.	idem.
Vicia sativa vulgaris semine nigro, *C. B. P.* 344. La Vesse.	idem,
Ervum verum, *Camerarii Hort.* Orobus siliquis articulatis semine majore, *C. B. P.* 346. L'Ers.	idem,
Galega vulgaris, *C. B. P.* 352. Le Galega, ou Rue de Chévre.	Alexitaire & cordiale.

SECTION III.

Des Herbes à fleurs légumineuses, dont le pistile devient une gousse composée de différentes piéces attachées bout à bout.

Carminative. Ornitopodium majus, *C. B. P.* 350.
Le Pied d'Oiseau.

Ferrum Equinum Germanicum siliquis in summitate, *C. B. P.* 349.
Le Fer à Cheval vivace.

Ferrum Equinum siliquâ singulari, *C. B. P.* 349.
Le Fer à Cheval annuel.

Resolutive. Hedysarum Clipeatum flore suaviter rubente, *Eyst.*
Le Sainfoin d'Espagne.

Scorpioides buplevri folio, *C. B. P.* 287.
La Chenille.

SECTION IV.

Des Herbes à fleurs légumineuses, qui portent trois feuilles sur une queuë.

Vulneraire deterlive. Lotus sive Melilotus pentaphillos minor glabra, *C. B. P.* 332.
Le Lotier, ou Tréfle jaune.

Opthalmique. Trifolium pratense album, *C. B. P.* 327.
Le Tréfle.

Vulneraire astringente. Trifolium arvense humile spicatum, sive Lagopus, *C. B. P.* 328.
Le pied de Liévre.

Carminative. Melilotus officinarum Germaniæ, *C. B. P.* 331.
Le Melilot, ou Mirlirot.

Melilotus major odorata flore violaceo, *Mor. Hist. Oxon. Part.* 2. 161. — Vulneraire deterſive.
Le Lotier odorant.

Anonis ſpinoſa flore purpureo, *C. B. P.* 389. — Apéritive.
L'Areſte-Bœuf, ou Bugrande.

Anonis flore luteo parvo, *H. R. P.* — idem.
L'Areſte-Bœuf à fleur jaune.

Fœnum græcum ſativum, *C. B. P.* 348. — Réſolutive.
Le Fenu grec.

Medica ſylveſtris major erectior floribus purpuraſcentibus, *J. B.* 2. 382. — Rafraichiſſante.
La Luſerne.

Phaſeolus vulgaris, *Lob. Icon.* — Reſolutive.
L'Aricot.

SECTION V.

Des Herbes à fleurs légumineuſes, dont le piſtile devient une gouſſe diviſée en deux loges ſelon ſa longueur.

Aſtragalus luteus perennis procumbens, vulgaris, ſive ſylveſtris, *Mor. hiſt.* 107. Glyzirrhiza ſylveſtris floribus luteo palleſcentibus, *C. B. P.* 352. — Aperitive.
La Regliſſe ſauvage.

Tragacantha Maſſilienſis, *J. B.* 1. 407. — Rafraichiſſante & épaiſſiſſante.
La Barbe de Renard.

CLASSE II.

Suite des Herbes à fleurs irrégulieres composées de plusieurs feuilles.

SECTION PREMIERE.

Des Herbes à fleurs irrégulieres composées de plusieurs feuilles, & dont le pistile devient un fruit qui n'a qu'une cavité.

Vulneraire detersive. BAlsamina fœmina, *C. B. P.* 306.
La Balsamine des jardins.

Aperitive. Balsamina lutea, sive noli me tangere, *C. B. P.* 306.
La Balsamine jaune.

Emolliente. Viola martia purpurea flore simplici odoro, *C. B. P.* 199.
La Violette.

Hepatique. Fumaria officinarum & Diosc. *C. B. P.* 143.
La Fumeterre, ou Fiel de terre.

Résolutive. Reseda vulgaris, *C. B. P.* 100.
L'Herbe maure.

Febrifuge. Luteola Herba salicis folio, *C. B. P.* 100.
La Gaude ou Herbe à jaunir.

SECTION II.

Des Herbes à fleurs irrégulieres composées de plusieurs feuilles, dont le pistile devient un fruit à plusieurs loges ou capsules.

Sesamoides fructu stellato, *El. Bot.* 337 Reze-

da linariæ foliis, *C. B. Prod.* 42.
Sesamoïde.

Aconitum salutiferum, sive Anthora, *C. B. P.* 184. — Alexitere & Cordiale.
L'Anthòra.

Aconitum cæruleum, seu Napellus, 1. *C. B. P.* 183.
Le Napel.

Aconitum lycoctonum luteum, *C. B. P.* 183.
Le Tue-Loup.

Delphinium segetum, *El. Bot.* 339. Consolida regalis arvensis, *C. B. P.* 142. — Ophtalmique.
Le Pied d'Aloüette.

Delphinium Platani folio, Staphisagria dictum, Staphisagria, *Math.* 1231. — Errhyne ou Sternutatoire.
L'Herbe aux Poux.

Aquilegia sylvestris, *C. B. P.* 144. — Aperitive.
L'Ancolie, ou Gand de Nôtre-Dame.

Fraxinella, *Cl. Hist.* 100. — Alexitaire & Cordiale.
La Fraxinelle, ou Dictam blanc.

Fraxinella niveo flore, *Cl. Hist.* 100. — idem.
La Fraxinelle à fleur blanche.

Cardamindum ampliore folio & majori flore, *El. Bot.* 341. Viola Indica scandens nasturii sapore, maxima odorata, *H. L. B.* — Antiscorbutique.
La grande Capucine.

Cardamindum minus vulgare, *El. Bot.* 341. Nasturtium Indicum majus, *C. B. P.* 306. — idem.
La petite Capucine.

Melianthus Africanus, *H. L. B.* — Stomachique.
La Meliante.

Corindum ampliore folio fructu majore, *El. Bot.* 342. Halicacabum peregrinum multis,

ſive Corindum, *J. B.* 2. 173.
Le Pois de merveille.

SECTION III.

Des Herbes à fleurs irrégulieres compoſées de pluſieurs feuilles, & dont le calice devient un fruit rempli de ſemences ſemblables à la ſciure de bois.

Alexitaire & Cordiale. Orchis morio mas foliis maculatis, *C. B. P.* 81.
La Satirion mâle.

idem. Orchis morio fœmina, *C. B. P.* 82.
La Satirion femelle.

Helleborine latifolia montana, *C. B. P.* 186.
L'Helleborine.

Vulneraire deterſive. Ophris bifolia, *C. B. P.* 87.
La Double-Feuille.

CLASSE XII.

Des Herbes qui portent des fleurs à fleurons.

SECTION PREMIERE.

Des Herbes qui portent des fleurs à fleurons, qui ne laiſſent aucune ſemence après eux.

Aperitive. Xantium, *Dod. Pempt.* 39. Lappa minor Xantium Dioſcoridis, *C. B. P.* 198.
La petite Bardane.

Cephalique. Ambroſia maritima àrtemiſiæ foliis inodoris elatior, *H. L. B.*
L'Ambroſie.

Gnaphalodes Lusitanica, *El. Bot.* 349. Gnaphalium supinum Echinato semine, *U. L.*
Le Gnaphalodes.

SECTION II.

Des Herbes dont les fleurs sont composées de fleurons réguliers ramassés par gros bouquets dans la plûpart des especes, & dont les fleurons laissent chacun après eux une semence aigrettée dans presque tous les genres.

Carduus stellatus, sive Calcitrapa, *J. B.* 3. 89. Le Chardon étoilé.	Aperitive.
Carduus stellatus luteus foliis Cyani, *C. B. P.* 387. Le Chardon étoilé à fleurs jaunes.	idem.
Carduus albis maculatis notatus vulgaris, *C.B.P.* 381. Le Chardon-Marie, Artichaud sauvage.	Diaphoretique & Sudorifique.
Carduus Tomentosus Acanthi folio vulgaris, *I. R. H.* 441. Le Chardon.	idem.
Carduus, seu Polyacantha vulgaris, *I. R. H.* 441. Le Poliacante.	idem.
Carduus capite rotundo tomentoso, *C. B. P.* 382. Le Chardon aux Anes, Onophordon.	Resolutive.
Cinara hortensis foliis non aculeatis, *C.B.P.* 383. L'Artichaud.	Aperitive.
Cinara sylvestris latifolia, *C. B. P.* 383. Le Cardon d'Espagne.	idem.

Vulneraire aſtringente.	Jacea nigra pratenſis latifolia, *J. B.* 3. 27. La Jacée des prez.
Reſolutive.	Jacea nemorenſis quæ Serratula vulgò, *El. Bot.* 353. Serratula, *Dod. Pempt.* 42. La Sarrette.
Opthalmique.	Cyanus ſegetum, *C. P. B.* 273. Le Bluet, Aubiſoin.
	Cyanus floridus odoratus Turcicus, ſive Orientalis & minor, *Park. Th.* 481. L'Ambrette ou Fleur du Grand Seigneur.
Reſolutive.	Cirſium arvenſe Sonchi folio, radice repente caule tuberoſo, *I. R. H.* 448. Le Chardon Hemoroïdal.
Hepatique.	Centaurium majus folio in lacinias plures diviſo, *C. B. P.* 117. La grande Centaurée.
idem.	Centaurium alpinum luteum, *C. B. Prodr.* 56. La grande Centaurée à fleurs jaunes.
Aperitive.	Lappa major arctium Dioſc. *C. B. P.* 198. La Bardane, Glouteron.
Diaphoretique & Sudorifique.	Cnicus ſylveſtris hirſutior, ſive Carduus benedictus, *C. B. P.* 378. Le Chardon bénit.
idem.	Cnicus atractilis lutea dictus, *H. L. Bat.* Le Chardon bénit des Pariſiens.
Purgative.	Carthamus officinarum flore croceo, *I. R. H.* 457. Le Safran bâtard, ou Graine de Perroquet.

SECTION III.

Des Herbes dont les fleurs ſont compoſées de fleurons réguliers ramaſſés par petits bouquets, & qui laiſſent chacun après eux une ſemence aigrettée.

Petaſites major & vulgaris, *C. B. P.* 197. L'Herbe aux Teigneux.	Diaphoretique & Sudorifique.
Elichryſum, ſeu Stœchas citrina latifolia, *C. B. P.* 264. Le Stecas citrin.	Vulneraire aperitive.
Elichryſum montanum flore rotundiore purpureo, *I. R. H.* 453. Le Pied-de-Chat.	Bechique.
Filago, ſeu Impia, *Dod. Pempt.* 66. Gnaphalium vulgare majus, *C. B. P.* 263. L'Herbe à Cotton.	idem.
Coniſa major vulgaris, *C. B. P.* 265. La Coniſe.	Hiſterique.
Eupatorium Cannabinum, *C. B. P.* 320. L'Eupatoire d'Avicenne.	Hepatique.
Senecio minor vulgaris, *C. B. P.* 131. Le Seneçon.	Emolliente.

SECTION IV.

Des Herbes qui ont la fleur à fleurons réguliers, qui laiſſent chacun après eux une ſemence ſans aigrette.

Abſinthium vulgare majus, *J. B.* 3. 168. La grande Abſinthe.	Stomachique.

Stomachique.	Abſinthium Ponticum tenuifolium Incanum, *C. B. P.* 138. La petite Abſinthe Pontique.
idem.	Abſinthium ſeriphium gallicum, *C. B. P.* 139. L'Abſinthe maritime.
Diaphoretique & Sudorifique.	Abſinthium Alpinum candidum humile, *C. B. P.* 139. L'Abſinthe des Alpes, ou Genepi.
Stomachique.	Abrotanum mas anguſtifolium majus, *C. B. P.* 136. L'Aurofne mâle, ou Garde-Robe.
idem.	Abrotanum mas Lini folio acriori & odorato, *El. Bot.* 364. Dracunculus hortenſis, *C. B. P.* 98. L'Eſtragon.
Hiſterique.	Artemiſia vulgaris major, *C. B. P.* 137. L'Armoiſe.
Stomachique.	Santolina foliis teretibus, *El. Bot.* 365. Abrotanum fœmina foliis teretibus, *C. B. P.* 136. L'Aurofne femelle.
idem.	Santolina folio Cupreſſi, *El. Bot.* 365. Abrotatanum fœmina foliis Cupreſſi. La Santoline.
idem.	Gnaphalium maritimum, *C. B. P.* 263. L'Herbe blanche.
idem.	Tanacetum vulgare luteum, *C. B. P.* 132. La Taneſie.
idem.	Tanacetum hortenſe foliis & odore Menthæ, *H. L. Bat.* & appendice. Le Coq.
Errhyne ou Sternutatoire.	Bidens foliis tripartito diviſis, *Ceſalp.* 488. Cannabina aquatica folio tripartito diviſo, *C. B. P.* 321. Le Chanvre aquatique.

SECTION V.

Des Herbes qui ont les fleurs composées de fleurons réguliers ramassés en boule, & soutenus chacun par un calice particulier.

Echinopus major, *J. B.* 3. 69. La Boulette, Echinope.	Aperitive.

SECTION VI.

Des Herbes qui ont la fleur composée de fleurons irréguliers ramassés par bouquets, & soutenus chacun par un calice particulier.

Scabiosa pratensis hirsuta quæ officinarum, *C. B. P.* 269. La Scabieuse des prez.	Diaphoretique & Sudorifique.
Scabiosa folio integro hirsuto, *I. R. H.* 466. La Scabieuse des bois, ou Mors du Diable.	idem.
Dipsacus sativus, *C. B. P.* 385. Le Chardon à foulon.	Opthalmique.
Dipsacus sylvestris, aut Virga pastoris major, *C. B. P.* 385. La Verge de Pasteur.	
Globularia vulgaris, *I. R. H.* 467. Bellis cærulea globularia Monspeliensium, *Adv.* 199. La Globulaire.	Vulneraire detersive.
Globularia fructicosa Myrthifolia tridentato, *El. Bot.* 371. L'Alipum.	Purgative.

CLASSE XIII.

Des Herbes qui portent des fleurs à demi-fleurons.

SECTION PREMIERE.

Des Herbes qui ont les fleurs à demi-fleurons, & dont les semences sont aigrettées.

Aperitive.	DEns leonis latiore folio, *C. B. P.* 126. Le Pissenlit, Dent de Lion.
Bechique.	Hieracium murorum folio pilosissimo, *C. B. P.* 129. Pulmonaria Gallica, sive aurea, *Tab. Icon.* 194. La Pulmonaire des François.
Vulneraire astringente.	Pilosella major repens hirsuta, *C. B. P.* 262. La Pilosele, Oreille de Souris.
Rafraichissante & épaississante.	Lactuca capitata, *C. B. P.* 123. La Laituë Pommée.
idem.	Lactuca Romana longa dulcis, *J. B.* 2. 998. La Laituë Romaine.
idem.	Lactuca sylvestris costa spinosa, *C. B. P.* 123. La Laituë sauvage.
idem.	Sonchus asper non laciniatus, *C. B. P.* 123. Le Laitron épineux.
idem.	Sonchus lævis laciniatus latifolius, *C. B. P.* 124. Le Laitron doux.
idem.	Sonchus lævis angustifolius, *C. B. P.* 124. Le Laitron, terre Crespe.
Vulneraire detersive.	Zacintha sive chicorium verucarium, *Math.* 505. Le Zacinthe.
Diaphoretique & Sudorifique.	Scorzonera latifolia sinuata, *C. B. P.* 275. La Scorzonaire, Cercifi d'Espagne.
idem.	Tragopogon purpureo-cæruleum Porri folio

quod Artifi vulgò, *C. B. P.* 274.
Le Cercifi commun.

Tragopogon Pratenſe luteum majus, *C. B. P.* 274. — Diaphoretique & Sudorifique.
La Barbe de bouc.

Section II.

Des Herbes qui ont les fleurs à demi-fleurons, & dont les ſemences ſont ſans aigrette.

Cichorium ſylveſtre ſive officinarum, *C. B. P.* 125. — Aperitive.
La Chicorée ſauvage.

Cichorium latifolium ſive Endivia vulgaris, *El. Bot.* 381. Intibus ſativa latifolia, ſive Endivia vulgaris, *C. B. P.* 125. — Rafraichiſſante.
L'Endive, ou Scariole.

Cichorium criſpum, *El. Bot.* 381. Intibus criſpa, *C. B. P.* 125. — idem.
La Chicorée friſée.

Lampſana, *Dod. Pempt.* 675. — Vulneraire deterſive.
La Lampſane.

Scolymus chryſantemos, *C. B. P.* 384.
L'Epine jaune.

CLASSE XV.

Des Herbes à fleurs radiées.

Section Premiere.

Des Herbes à fleurs radiées, & à ſemences aigrettées.

Aster pratenſis Autumnalis Coniſæ folio, *I. R. H.* 482. — Bechique.
La petite Aunée, ou Coniſe des prez.

	Aſter Atticus cæruleus vulgaris, *C. B. P.* 267. L'Oeil de Chriſt.
Bechique.	Aſter omnium maximus Helenium dictus, *I. R. H.* 483. L'Aunée, Enula campana.
Vulneraire aperitive.	Virga aurea latifolia ſerrata, *C. B. P.* 268. La Verge d'or à larges feuilles.
idem.	Virga aurea anguſtifolia ſerrata, *C. B. P.* 268. La Verge d'or à feuilles étroites.
Vulneraire deterſive.	Jacobea vulgaris laciniata, *C. B. P.* 131. La Jacobée, Herbe de S. Jacques.
Bechique.	Jacobea foliis ferulaceis flore minore, *I. R. H.* 486. L'Achillée.
Vulneraire deterſive.	Jacobea Alpina foliis longioribus ſerratis, *I. R. H.* 485. La Conſoude dorée.
Bechique.	Tuſſilago vulgaris, *C. B. P.* 197. Le Tuſſilage, Pas-d'Ane.
Alexitaire & Cordiale.	Doronicum radice dulci, *C. B. P.* 184. Le Doronic.
idem.	Doronicum Radice ſcorpii, *C. B. P.* 184. Le Doronic Romain.

SECTION II.

Des Herbes à fleurs radiées qui ont les ſemences ornées d'un chapiteau de feuilles.

Vulneraire deterſive.	Corona Solis tabernæ, *Icon.* 763. Le Soleil.
	Corona Solis parvo flore Tuberosâ radice, *I. R. H.* 489. Le Taupinambour.

SECTION III.

Des Herbes à fleurs radiées, dont les semences n'ont ni aigrette, ni chapiteau.

Bellis ſylveſtris minor, *C. B. P.* 261. La petite Paquerette.	Vulneraire aſtringente.
Chryſanthemum ſegetum, *Lob. Icon.* 552. La Fleur dorée, ou Marguerite jaune.	Vulneraire deterſive.
Leucanthemum Canarienſe foliis Cryſanthemi Pyretri ſapore, *I. R. H.* 493. La Pyretre des Canaries.	Errhyne, ou Sternutatoire.
Leucanthemum vulgare, *I. R. H.* 492. Bellis ſylveſtris caule folioſo major, *C. B. P.* 261. La grande Marguerite.	Vulneraire aſtringente.
Matricaria vulgaris ſeu ſativa, *C. P. B.* 133. La Matricaire.	Hiſterique.
Chamæmelum vulgare leucanthemum Dioſc. *C. B. P.* 135. La Camomille vulgaire, ou commune.	Carminative.
Chamæmelum nobile flore multiplici, *C. B. P.* 135. La Camomille Romaine.	idem.
Chamæmelum fœtidum, *C. B. P.* 135. La Maroute, ou Camomille puante.	idem.
Cotula flore luteo radiato, *El. Bot.* 396. Buphtalmum Cotulæ folio, *C. B. P.* 134. Le Cotula.	Vulneraire deterſive.
Bupthalmum Creticum Cotulæ facie flore albo, *Breyni. Cent.* 1. 150. La Pyretre, ou Racine ſalivaire.	Errhyne ou Sternutatoire.
Bupthalmum tanaceti minoris folio, *C. B. P.* 134. L'Oeil de Bœuf.	Vulneraire aperitive.

Vulneraire astringente. Millefolium vulgare album, *C. B. P.* 140.
La Mille-feuille.

Errhyne ou Sternutatoire. Ptarmica vulgaris folio longo serrato, flore albo, *J. B.* 3. 147.
L'Herbe à éternuer.

Stomachique. Ptarmica lutea, suaveolens, *El. Bot.* 398. Ageratum foliis serratis, *C. B. P.* 221.
L'Eupatoire de Mesué.

SECTION IV.

Des Herbes à fleurs radiées, & les semences enfermées dans des capsules.

Histerique. Caltha vulgaris, *C. B. P.* 275.
Le Souci de jardin.

idem. Caltha arvensis, *C. B. P.* 276.
Le Souci sauvage, ou de vigne.

SECTION V.

Des Herbes à fleurs radiées, composées de fleurons & de feuilles plattes.

Xeranthemum flore simplici purpureo majore, *H. L. B.* Jacæa oleæ folio capitulis simplicibus, *C. B. P.* 272.
L'Immortelle.

Alexitaire & Cordiale. Carlina acaulos magno flore, *C. B. P.* 380.
La Carline, Cameleon blanc.

idem. Carlina caulescens, magno flore albicante, *C. B. P.* 380.
La Carline, Cameleon noir.

CLASSE

CLASSE XV.

Des Herbes qui ont les fleurs à Etamines.

SECTION PREMIERE.

Des Herbes qui ont les fleurs à Etamines, & dont la partie postérieure du calice devient le fruit

ASarum, *Dod. Pempt.* 358. Le Cabaret. — Purgative.

Asarum Americanum majus, *H. R. P.* Asarum Canadense, *Corn.* 24. Le Cabaret du Canada. — idem.

Beta alba, vel pallescens quæ Cicla officinarum, *C. B. P.* 118. La Poirée-Bette, Reparcé. — Emolliente.

Beta rubra vulgaris, *C. B. P.* 118. La Poirée rouge, Bette-rave. — idem.

SECTION II.

Des Herbes qui ont les fleurs à Etamines, & dont le pistile devient une ou plusieurs graines enveloppées par le calice de la fleur.

Acetosa pratensis, *C. B. P.* 114. L'Oseille longue, Surelle. — Aperitive.

Acetosa rotundifolia hortensis, *C. B. P.* 114. L'Oseille ronde. — idem.

Lapathum hortense latifolium, *C. B. P.* 115. La Patience de jardin. — idem.

Aperitive. Lapathum folio acuto plano, *C. B. P.* 115.
La Patience ſauvage.

Vulneraire aſtringente. Lapathum folio acuto rubente, *C. B. P.* 114.
La Patience rouge, ou Sang de Dragon.

Purgative. Lapathum folio rotundo Alpinum, *J. B.* 2. 987.
Le Rapontique de montagne, fauſſe Rubarbe.

Antiſcorbutique. Lapathum aquaticum folio Cubitali, *C. B. P.* 116.
La Patience aquatique, ou Parelle de marais.

Emolliente. Atriplex hortenſis alba, ſive pallidè virens, *C. B. P.* 119.
L'Arroche, Belle-Dame, Follette.

idem. Atriplex hortenſis rubra, *C. B. P.* 119.
L'Arroche rouge.

Rafraichiſſante. Atriplex latifolio, ſeu Halimus fruticoſus. *Mor. Hiſt.* 607.
L'Halimus, Pourpier de mer.

Hiſterique. Chenopodium fœtidum, *El. Bot.* 406. Atriplex fœtida, *C. P. B.* 119.
L'Arroche puante.

idem. Chenopodium Ambroſioides folio ſinuato, *El. Bot.* 406. Botris Ambroſioides vulgaris, *C. B. P.* 138.
Le Botris.

idem. Chenopodium Ambroſioides Mexicanum, *El. Bot.* 406. Botris Ambroſioides Mexicana, *C. B. P.* 138.
Le Botris du Mexique.

Emolliente. Chenopodium folio triangulo, *El. Bot.* 406. Lapathum unctuoſum folio triangulo, *C. B. P.* 115.
Le bon Henry.

Blitum album majus, *C. B. P.* 118. La Blette blanche.	Emolliente.
Blitum rubrum majus, *C. B. P.* 118. La Blette rouge.	idem.
Herniaria hirſuta, *J. B.* 3. 379. L'Herniole, Turquette.	Aperitive.
Paronychia Hiſpanica, *Cluſ. Hiſp.* 478. Poligonum minus candicans ſupinum, *Bot. Monſ.* La Paronychia.	Vulneraire aſtringente.
Alchymilla vulgaris, *C. B. P.* 319. Le Pied de Lion.	idem.
Alchymilla Montana minimia, *Col. Part.* 1. 146. La Perce-Pierre.	Aperitive.
Parietaria officinarum, & Dioſc. *C. B. P.* 121. La Parietaire.	Emolliente.
Perſicaria mitis maculoſa & non maculoſa, *C. B. P.* 101. La Perſicaire maculée.	Vulneraire deterſive.
Perſicaria urens, ſeu Hydropiper, *C. B. P.* 101. Le Curage, Poivre d'eau.	idem.
Poligonum latifolium, *C. B. P.* 281. La Renouée, Trainaſſe.	Vulneraire aſtringente.
Fagopirum vulgare erectum, *El. Bot.* 412. Eryſimum Theophraſti folio hederacæo, *C. B. P.* 27. Le Bled noir, ou Saraſin.	Reſolutive.
Biſtorta major radice majus intortâ, *C. B. P.* 192. La grande Biſtorte.	Vulneraire aſtringente.
Biſtorta major radice minus intortâ, *C. B. P.* 192. La petite Biſtorte.	idem.

Section III.

Des Herbes qui ont les fleurs à Etamines, & les semences propres à faire du pain, & de leurs semblables.

Resolutive. Triticum Hybernum Aristis carens, *C. B. P.* 21.
Le Bled, Froment.

idem. Secale Hybernum vel majus, *C. B. P.* 22.
Le Seigle.

idem. Hordeum Polystichon vernum, *C. B. P.* 22.
L'Orge.

idem. Oriza, *Mathioli* 403.
Le Ris.

idem. Avena vulgaris, *C. B. P.* 23.
L'Avoine.

Rafraichissante. Milium semine luteo, *C. B P.* 26.
Le Millet.

idem. Milium arundinacæum subrotundo semine, Sorgo nominatum, *C. B. P.* 26.
Le grand Millet noir.

Panicum Germanicum, sive Panicula minor, *C. B. P.* 27.
Le Panis.

Aperitive. Gramen Caninum Arvense, sive Gramen Diosc. *C. B. P.* 1.
Le Chiendent.

idem. Gramen Dactilon radice repente, sive officinarum, *I. R. H.* 520.
Le Chiendent, Pied de poule.

Histerique. Arundo vulgaris, sive Phragmites Dioscoridis, *C. B. P.* 17.
Le Roseau.

Section IV.

Des Herbes qui ont les fleurs à Etamines dans des têtes écailleuſes.

Acorus verus, ſive Calamus aromaticus officinarum, *C. B. P.* 34. Le Roſeau odorant.	Hiſterique.
Cyperus rotundus vulgaris, *C. B. P.* 14. Le Souchet rond.	idem.
Cyperus odoratus radice longâ, ſive Cyperus officinarum, *C. B. P.* 14. Le Souchet long.	idem.
Cyperus rotundus Eſculentus anguſtifolius, *C. B. P.* 14. Le Souchet Sultan.	Rafraichiſſante & épaiſſiſſante.

Section V.

Des Herbes qui ont les fleurs à Etamines ſéparées des fruits ſur le même pied.

Mays granis aureis, *I. R. H.* 531. Le Bled de Turquie à fruit jaune.	Réſolutive.
Mays granis rubris, *I. R. H.* 531. Le Bled de Turquie à fruit rouge.	idem.
Lacryma Job, *Cl. Hiſt.* 216. La Larme de Job.	Aperitive.
Ricinus vulgaris, *C. B. P.* 432. Le Ricin, Palma Chriſti.	Purgative.
Ricinus Americanus major ſemine nigro, *C. B. P.* 432. Le Medecinier, Pignon d'Inde.	idem.

SECTION VI.

Des Herbes qui ont les fleurs à Etamines, qui naiſſent ordinairement ſur des pieds qui ne portent aucun fruit, & dont les fruits naiſſent ſur des pieds qui ne portent ordinairement aucunes fleurs.

Vulneraire aſtringente. Equiſetum majus aquaticum, *J. B.* 3. 729.
La Preſle, Queuë de cheval.

idem. Equiſetum minus terreſtre, *J. B.* 730. &c.
La Preſle des champs.

Emolliente. Spinachia vulgaris capſulâ ſeminis aculeatâ, *El. Bot.* 425.
L'Epinar.

idem. Mercurialis teſticulata, ſive mas Dioſcoridis & Plinii, *C. B. P.* 121.
La Mercuriale mâle.

idem. Mercurialis ſpinata ſive fœmina Dioſc. & Plinii, *C. B. P.* 121.
La Mercuriale femelle.

idem. Mercurialis montana teſticulata, *C. B. P.* 122.
La Mercuriale mâle de montagne.

idem. Mercurialis montana ſpicata, *C. B. P.* 122.
La Mercuriale femelle de montagne.

Vulneraire aſtringente. Urtica urens maxima, *C. B. P.* 232.
La grande Ortie.

idem. Urtica urens minor, *C. B. P.* 232.
L'Ortie griéche.

idem. Urtica urens pilulas ferens, 1. Dioſc. ſemine lini, *C. B. P.* 232.
L'Ortie Romaine.

Cannabis ſativa, *C. B. P.* 320. Le Chanvre.	Hepatique.
Cannabina Cretica fructicoſa. *Corol. I. H. R.* 52. Le Chanvre de Créte.	Purgative.
Lupulus mas, *C. B. P.* 298. Le Houblon mâle.	Hepatique.
Lupulus fœmina, *C. B. P.* 298. Le Houblon femelle.	idem.
Saururus fruteſcens, foliis Plantaginis fructu breviori, *Plum. Pl. Amer. fig.* 76. Poivre long, Queuë de Lezard, eſpéce de Betel.	Errhine ou Sternutatoire & ſalivante.

CATALOGUE DES ARBRES ET DES ARBRISSEAUX.

CLASSE XVIII.

Des Arbres & des Arbrisseaux qui ont les fleurs à Etamines.

SECTION PREMIERE.

Des Arbres & des Arbrisseaux dont les fleurs sont à Etamines, & attachées aux jeunes fruits.

Apéritive. FRaxinus excelsior, *C. B. Pin.* 416.
Le Frêne.

Siliqua Edulis, *C. B. Pin.* 402.
Le Carouge.

SECTION II.

Des Arbres & des Arbrisseaux qui ont les fleurs à Etamines séparées des fruits sur le meme pied.

Sudorifique. Buxus arborescens, *C. B. Pin.* 471.
Le Buis en arbre.

idem. Buxus foliis rotundioribus, *C. B. Pin.* 471.
Le Buis nain.

SECTION

SECTION III.

Des Arbres & des Arbrisseaux dont les fleurs qui sont à Etamines naissent sur des pieds qui ne portent point de fruits, & dont les fruits naissent sur des pieds qui ne fleurissent pas.

Therebinthus vulgaris, *C. B. Pin.* 400. — Apéritive.
Le Thérebinthe.

Lentiscus vulgaris, *C. B. Pin.* 399.
Le Lentisque.

Lentiscus Peruana, *C. B. Pin.* 399. — Errhyne ou Sternutatoire.
Le Lentisque du Perou, Poivrier du Perou.

CLASSE XIX.

Des Arbres & des Arbrisseaux à châtons.

SECTION PREMIERE.

Des Arbres & des Arbrisseaux dont les châtons sont séparés des fruits sur le même pied, & dont les fruits sont osseux.

NUx juglans, sive Regia vulgaris, *C. B. Pin.* 417. — Sudorifique.
Le Noyer.

Corylus sativa fructu albo minori, sive vulgaris, *C. B. Pin.* 417. — Vulneraire astringente.
Le Noisettier.

SECTION II.

Des Arbres & des Arbrisseaux dont les châtons sont separés des fruits sur le même pied, & dont les semences ont une enveloppe semblable en quelque maniere à un cuir leger.

Vulneraire astringente. Quercus latifolia mas, quæ pediculo brevi est, *C. B. Pin.* 419.
Le Chêne.

idem. Ilex oblongo serrato folio, *C. B. Pin.* 425.
Le Chêne vert.

Alexitaire & cordiale. Ilex aculeata cocci glandifera, *C. B. Pin.* 424.
Le Kermés, ou Graine d'Ecarlate.

Vulneraire astringente. Suber latifolium perpetuò virens, *C. B. Pin.* 424.
Le Liége.

Vulneraire deterssive. Fagus, *Dod. Pempt.* 832.
Le Hêtre.

Vulneraire astringente. Castanea sativa, *C. B. Pin.* 418.
Le Châteignier.

SECTION III.

Des Arbres & des Arbrisseaux dont les châtons sont séparés des fruits sur le même pied, & dont les fruits sont écailleux.

Apéritive. Abies taxi folio, fructu sursum spectante, *El. Bot.* 457.
Le Sapin.

Albies tenuiore folio, fructu deorſum inflexo, *El. Bot.* 457. Le Picea.	Aperitive.
Pinus ſativa, *C. B. Pin.* 491. Le Pin.	Rafraichiſſante.
Larix folio deciduo conifera, *J. B.* 1. 265. La Méleſe.	Purgative.
Thuya Theophraſti, *C. B. Pin.* 488. L'Arbre de Vie.	Vulneraire aſtringente.
Tamariſcus Germanica, *Lob. Icon.* 218. Le Tamaris d'Allemagne.	Aperitive.
Tamariſcus Narbonenſis, *Lob. Icon.* 218. Le Tamaris.	idem.
Cupreſſus ramos extra ſe ſpargens, quæ mas Plinii, *I. R. H.* 587. Le Cyprès mâle.	Vulneraire aſtringente.
Cupreſſus metâ in faſtigium convolutâ quæ fœmina Plinii, *I. R. H.* 587. Le Cyprès femelle.	idem.
Alnus rotundifolia glutinoſa viridis, *C. B. Pin.* 428. L'Aune.	Reſolutive.
Betula, *Dod. Pempt.* 839. *J. B.* 1. 148. Le Bouleau.	Aperitive.

SECTION IV.

Des Arbres & des Arbriſſeaux, dont les châtons ſont ſéparés des fruits ſur le même pied, & dont les fruits ſont ou de petites bayes, ou compoſés de petites bayes.

Cedrus folio Cupreſſi major fructu flaveſcente, *C. B. Pin.* 487.
Le Cedre.

Sudorifique. Juniperus vulgaris arbor. *C. B. Pin.* 489.
Le Genevrier.

Histerique. Sabina folio Tamarisci Dioscoridis, *C. B. Pin.* 487.
Le Savinier, ou Sabine.

idem. Sabina folio Cupressi, *C. B. Pin.* 487.
Sabine à feuille de Cyprès.

Rafraichissante. Morus fructu nigro, *C. B. Pin.* 459.
Le Meurier à fruit noir.

idem. Morus fructu albo, *C. B. Pin.* 459.
Le Meurier à fruit blanc.

SECTION V.

Des Arbres & des Arbrisseaux, dont les châtons sont séparés des fruits sur le même pied, & dont les fruits sont secs & ramassés en pelotons.

Platanus Orientalis verus, *Park. Th.* 1427.
Le Platane.

SECTION VI.

Des Arbres & des Arbrisseaux, dont certains pieds portent des châtons sans fruits, & dont certains autres pieds portent des fruits sans châtons.

idem. Salix vulgaris alba arborescens, *C. B. Pin.* 473.
Le Saule.

Emolliente. Populus alba majoribus foliis, *C. B. Pin.* 429.
Le Peuplier blanc.

idem. Populus nigra, *C. B. Pin.* 429.
Le Peuplier noir.

CLASSE XX.

Des Arbres & des Arbrisseaux, dont la fleur est d'une seule feuille.

SECTION PREMIERE.

Des Arbres & des Arbrisseaux qui ont la fleur d'une seule feuille, & dont le pistile devient une baye, ou fruit moû, & rempli de pepins.

RHamnus Catharticus, *C. B. Pin.* 478. Le Nerprun, ou Noirprun, Bourg-Epine.	Purgative.
Thymelea Lauri folio semper virens, sive Laureola mas, *I. R. H.* 595. Le Garou, ou Laureole mâle.	idem.
Thymelea Lauri folio deciduo, sive Laureola fœmina, *I. R. H.* 595. La Laureole femelle.	idem.
Alaternoides Africana Lauri serrato folio, Comm. præ & rarior, 67. La Palachine.	Histerique.
Alaternus prior Clusii, *Hisp.* 16. L'Alaterne.	Vulneraire aperitive.
Phyllyrea folio Ligustri, *C. B. Pin.* 476. La Filaria.	idem.
Ligustrum, *J. B.* 1. 528. Le Troësne.	Vulneraire detersive.
Laurus vulgaris, *C. B. Pin.* 460. Le Laurier franc.	Cephalique.

Bechique & Pectorale. Jasminum vulgatius flore albo, *C. B. Pin.* 397.
Le Jasmin.

Arbutus folio serrato, *C. B. Pin.* 460.
Arbousier.

SECTION II.

Des Arbres & des Arbrisseaux à fleur d'une seule feuille, dont le pistile devient une baye remplie ordinairement de quelques osselets.

Cephalique. Styrax folio mali Cotonei, *C. B. Pin.* 452.
Le Storax.

Emolliente. Olea sativa, *C. B. Pin.* 472.
L'Olivier franc.

idem. Olea sylvestris folio duro subtùs incano, *C. B. Pin.* 472.
L'Olivier sauvage.

idem. Aquifolium sive Agrifolium vulgò, *J. B.* 1. 114.
Le Houx.

Vulneraire astringente. Guaicana, *J. B.* 1. 238. Lotus Africana latifolia, *C. B. Pin.* 447.
La Gayac.

SECTION III.

Des Arbres & des Arbrisseaux à fleur d'une seule feuille, dont le pistile devient un fruit membraneux.

idem. Ulmus Campestris & Theophrasti, *C. B. Pin.* 426.
L'Orme.

SECTION IV.

Des Arbres & des Arbrisseaux à fleur d'une seule feuille, dont le pistile produit un fruit sec divisé en loges.

Lilac, *Math.* 1237. Syringa cærulea, *C. B. Pin.* 398.
Le Lilac.
Vulneraire astringente.

Erica vulgaris glabra, *C. B. Pin.* 485.
La Bruyere.
Opthalmique.

Vitex foliis angustioribus cannabinis modo dispositis, *C. B. Pin.* 475.
L'Agnus Castus.
Histerique.

SECTION V.

Des Arbres & des Arbrisseaux à fleur d'une seule feuille, dont le pistile devient une silique.

Nerion floribus rubescentibus, *C. B. Pin.* 464.
Le Laurier-Rose.
Errhyne où Sternutatoire.

Acacia foliis scorpioidis leguminosæ, *C. B. Pin.* 392.
La Cassie.
Vulneraire astringente.

SECTION VI.

Des Arbres & des Arbrisseaux à fleur d'une seule feuille, dont le calice devient une baye.

Sambucus fructu in umbellâ nigro, *C. B. Pin.* 456.
Le Sureau.
Purgative.

Purgative. Sambucus humilis ſive Ebulus, *C. B. Pin.* 456.
L'Yeble, ou petit Sureau.

idem. Opulus Ruellii, 281. Sambucus aquatica flore ſimplici, *C. B. Pin.* 456.
Le Sureau aquatique, ou Obier.

Opulus flore globoſo, *El. Bot.* 479. Sambucus aquatica flore globoſo, *C. B. Pin.* 456.
La Roſe de guelde.

Vulneraire aſtringente. Viburnum, *Math.* 217.
La Viorne.

idem. Vitis idæa foliis oblongis crenatis fructu nigricante, *C. B. Pin.* 470.
L'Airelle, ou le Mirtille.

Vulneraire deterſive. Caprifolium Germanicum, *Dod. Pempt.* 411. Periclimerum non perfoliatum Germanicum, *C. B. Pin.* 302.
Le Chevre-feuille.

SECTION VII.

Dés Arbres & des Arbriſſeaux à fleur d'une ſeule feuille, ſéparée des fruits.

Cephalique. Viſcum Baccis albis, *C. B. Pin.* 423.
Le Guy.

CLASSE

CLASSE XXI.

Des Arbres & des Arbriſſeaux à fleurs en roſe.

SECTION PREMIERE.

Des Arbres & des Arbriſſeaux à fleur en roſe, dont le piſtile devient une graine ou un fruit qui n'a qu'une cavité.

COtinus Coriaria, *Dod. Pempt.* 780. Le Fuſtet.	Vulneraire aſtringente.
Toxicodendron Triphyllon glabrum, *El. Bot.* 483. Hedera Trifolia Canadenſis, *Corn.* 96. Lierre du Canada.	
Rhus folio Ulmi, *C. B. Pin.* 414. Le Sumac.	idem.
Rhus Virginianum, *C. B. Pin. App.* 517. Le Sumac de Virginie.	idem.
Tilia fœmina folio majore, *C. B. Pin.* 426. Le Tilleul ou Tillau.	Cephalique.
Hippocaſtanum vulgare, *El. Bot.* 485. Caſtanea folio multifido, *C. B. Pin.* 419. Le Maronier d'Inde.	Errhyne ou Sternutatoire.

SECTION II.

Des Arbres & des Arbriſſeaux à fleur en roſe, dont le piſtile devient une baye ou un fruit compoſé de bayes.

Celtis fructu nigricante, *El. Bot.* 485. Lotus	Vulneraire aſtringente.

fructu Cerasi, *C. B. Pin.* 447.
Le Micocoulier.

Purgative. Frangula, *Dod. Pempt.* 784. Alnus nigra Baccifera, *C. B. Pin.* 428.
La Frangula.

Vulneraire detersive. Hedera arborea, *C. B. Pin.* 305.
Le Lierre.

Bechique. Vitis vinifera, *C. B. Pin.* 299.
La Vigne.

Vulneraire astringente. Berberis dumetorum, *C. B. Pin.* 453.
L'Epine Vinette.

Vulneraire detersive. Rubus vulgaris, sive rubus fructu nigro, *C. B. Pin.* 479.
La Ronce.

SECTION III.

Des Arbres & des Arbrisseaux à fleur en rose, dont le pistile devient un fruit divisé en deux loges.

Vulneraire astringente. Acer montanum candidum, *C. B. Pin.* 430.
Lérable.

Staphylodendron, *Math.* 274. Pistachia sylvestris, *C. B. Pin.* 401.
Le Nez-coupé.

Aperitive. Paliurus, *Dod. Pempt.* 756. Rhamnus folio subrotundo fructu compresso, *C. B. Pin.* 477.
Le Paliure.

idem. Azedarach, *Dod. Pempt.* 848. Arbor Fraxini folio flore cæruleo, *C. B. Pin.* 415.
L'Azedarach.

Errhyne, ou Sternutatoire. Evonymus vulgaris granis rubentibus, *C. B. Pin.* 428.
Le Fusain.

SECTION IV.

Des Arbres & des Arbrisseaux à fleur en rose, dont le pistile devient un fruit composé de quelques graines.

Spiræa opuli folio, *El. Bot.* 490. Anonymos Ribesii foliis, *Icon. Rob.*
La Spirea.

Syringa alba, sive Philadelphus Athenæi, *C. B. Pin.* 398.
La Siringa.

SECTION V.

Des Arbres & des Arbrisseaux qui ont les fleurs en rose, & le fruit en gousse.

Senna Italica, sive foliis obtusis, *C. B. Pin.* 397. Purgative.
Le Sené.

Cassia fistula Alexandrina, *C. B. Pin.* 403. idem.
La Casse.

SECTION VI.

Des Arbres & des Arbrisseaux à fleurs en rose, & dont le pistile devient un fruit à pepin.

Aurantium vulgare dulci medullâ, *Ferr.* 377. Alexitaire & cordiale.
L'Oranger.

Citreum vulgare, *El. Bot.* 493. Malum Citreum dulci medullâ, *Ferr.* 73. idem.
Le Citronnier.

Alexitaire & Cordiale. Limon vulgaris, *Ferr.* 193.
Le Limonier.

SECTION VII.

Des Arbres & des Arbrisseaux à fleurs en rose, & dont le pistile devient un fruit à noyau.

Purgative. Prunus fructu parvo dulci atro-cæruleo, *I. R. H.* 622.
Le Prunier.

idem. Prunus sylvestris, *C. B. Pin.* 444.
Le Prunier sauvage, ou Prunellier.

Bechique. Armeniaca fructu majori, nucleo amaro, *El. Bot.* 495.
L'Abricotier.

Purgative. Persica molli carne, vulgaris viridis & alba, *C. B. Pin.* 440.
Le Pêcher.

Rafraichissante. Cerasus sativa fructu rotundo, rubro & acidó, *El. Bot.* 496.
Le Cerisier.

idem. Cerasus fructu aquoso, *El. Bot.* 497.
Le Guignier.

Bechique. Amigdalus sativa, *C. B. Pin.* 441.
L'Amandier.

idem. Ziziphus, *Dod. Pempt.*
Le Jujubier.

Cephalique. Lauro-cerasus, *Clu. Hist.* 4.
Le Laurier-Cerise.

SECTION VIII.

Des Arbres & des Arbrisseaux à fleur en rose, dont le calice devient un fruit à pepin.

Pyrus sativa, *C. B. Pin.* 439. Le Poirier.	Vulneraire astringente.
Cydonia fructu breviore & rotundiore, *I. R. H.* 633. Le Cognassier.	idem.
Sorbus sativa, *C. B. Pin.* 415. Le Sorbier.	idem.
Malus sativa fructu subrotundo è viridi pallescente acido dulci, *I. R. H.* 634. Le Pommier de Reinette.	Bechique.
Punica flore pleno majore, *I. R. H.* 636. Le Grenadier à fleurs doubles, ou Balauste.	Vulneraire astringente.
Punica quæ Malum Granatum fert, *Cæsalp.* 141. Le Grenadier à fruit.	idem.
Rosa Rubra multiplex, *C. B. Pin.* 481. La Rose de Provins.	idem.
Rosa rubra pallidior, *C. B. Pin.* 481. La Rose pâle.	Purgative.
Rosa Moscata simplici flore, *C. B. Pin* 482. La Rose Muscate.	idem.
Rosa sylvestris vulgaris, flore odorato incarnato, *C. B. Pin.* 482. L'Eglantier, ou Rosier sauvage.	Vulneraire astringente.
Grossularia hortensis major fructu rubro, *C. B. Pin.* 455. Le Groselier à fruit rouge.	Rafraichissante.

Rafraichiſſante. Groſſularia ſpinoſa ſativa, *C. B. Pin.* 455.
Le Groſelier épineux.

Alexitaire & Cordiale. Groſſularia non ſpinoſa fructu nigro majore, *C. B. Pin* 455.
Le Groſelier à fruit noir, ou Caſſis.

Vulneraire aſtringente. Myrthus latifolia Romana, *C. B. Pin.* 468.
Le Myrthe à larges feuilles.

idem. Myrthus minor vulgaris, *C. B. Pin.* 469.
Le petit Myrthe.

Section IX.

Des Arbres & des Arbriſſeaux à fleur en roſe, dont le calice devient un fruit à noyau.

idem. Cornus ſylveſtris mas, *C. B. Pin.* 447.
Le Cornoüillier mâle.

idem. Cornus fœmina, *C. B. Pin.* 447.
Le Cornoüillier femelle.

idem. Meſpilus Germanica folio laurino non ſerrato, ſive Meſpilus ſylveſtris, *C. B. Pin.* 453.
Le Neflier.

idem. Meſpilus Apii folio ſylveſtris ſpinoſa, ſive Oxiacantha, *C. B. Pin.* 454.
L'Epine blanche.

idem. Meſpilus Apii folio laciniato, *C. B. Pin.* 453.
L'Azerollier.

idem. Meſpilus aculeata, amygdali folio, *I. R. H.* 642. Pyracantha quibuſdam, *J. B.* 1. 51.
Le Buiſſon ardent.

CLASSE XXII.

Des Arbres & des Arbriſſeaux à fleurs légumineuſes.

SECTION PREMIERE.

Des Arbres & des Arbriſſeaux à fleurs légumineuſes, qui ont les feuilles ſeules, & alternes le long des branches.

Geniſta Juncea, *J. B.* 1. 395. Le Genêt d'Eſpagne.	Aperitive.
Geniſta ſpartium ſpinoſum majus primum flore luteo, *C. B. Pin.* 394. Le Genêt épineux.	
Geniſtella herbacea, ſive Chamæſpartium, *J. B.* 1. 393. Petit Genêt.	idem.
Siliquaſtrum, *Caſt. Dur.* 415. Siliqua ſylveſtris rotundifolia, *C. B. Pin.* 402. Le Guainier.	Vulneraire aſtringente.

SECTION II.

Des Arbres & des Arbriſſeaux à fleurs légumineuſes, & qui portent trois feuilles ſur une queuë.

Anagyris fœtida, *C. B. Pin.* 391. Le Bois puant.	Hiſterique.
Cytiſus Alpinus latifolius, flore racemoſo pendulo, *El. Bot.* 508. Anagyris non fætens	idem.

major vel Alpinas, *C. B. Pin.* 649.
Le Cytiſe des Alpes, ou Ebenier.

Apetitive. Cytiſo-Geniſta ſcoparia vulgaris flore luteo, *I. R. H.* 649. Geniſta anguloſa & ſcoparia, *C. B. Pin.* 395.
Le Genêt commun.

SECTION III.

Des Arbres & des Arbriſſeaux à fleurs légumineuſes, & qui portent des côtes feuillées.

Bechique. Pſeudoacacia vulgaris, *El. Bot.* 509. Arbor ſiliquoſa virginenſis ſpinoſa locus noſtratibus dicta, *Park. Th.* 1550.
L'Acacia.

Purgative. Colutea Veſicaria, *C. B. Pin.* 396.
Le Baguenaudier.

idem. Emerus, *Cæſalp.* 117. Colutea ſiliquoſa, ſeu Scorpioides major, *C. B. Pin.* 397.
Le Securidaca des Jardiniers.

Appendix

Appendix ou Supplément.

Ficus communis, *C. B. Pin.* 457. Le Figuier.	Bechique.
Smilax aſpera fructu rubente, *C. B. Pin.* 296. Le Smilax.	Sudorifique.
Chamælea tricoccos, *C. B. Pin.* 462. La Camelée.	Purgative.
Cuſcuta minor, *C. B. Pin.* 219. Caſſuta, ſive Cuſcuta, *J. B.* 3. 266. La Cuſcute.	Hepatique.
Cuſcuta minor, *I. R. H.* 652. Epithymum, ſive Cuſcuta minor, *J. B.* 3. 266. L'Epithym, ou Barbe de Moine.	idem.

EXPLICATION

Des noms abrégés des Auteurs, desquels il est fait mention dans ce Catalogue.

ADv. Adversaria nova stirpium, auctoribus Petro Penâ & Mathiâ de Lobel Medicis, *Londini* 1570. & 1606.

Anguil. Semplici del l'Excellente M. Luigi Anguillara, *in Venetia* 1561.

Bocç. Mus. Muscodi fisica di Paulo Boccone, *in Venetia* 1697.

Boërh. Ind. Alt. Hermani Boërhaave, Index alter Plantarum quæ in Horto Academico *Lugduno-Batavo* aluntur 1720.

Bot. Monſ. Botanicum Monspeliense, auctore Petro Magnol. *Monspelii* 1686.

Breyn. Prod. Jacobi Breynii Prodromus fasciculi rariorum Plantarum primus *Gedani* 1680, secundus *Gedani* 1689.

C. B. Pin. Casparis Bauhini Pinax Theatri Botanici, *Basileæ* 1623. & 1674.

Cæsalp. Andræas Cæsalpinus de Plantis, *Florentiæ* 1583.

Cam. Hort. Hortus Medicus & Philosophicus auctore Joanne Camerario, *Francofurti* 1688.

Cast. Dur. Herbario nuovo di Castore Durante, *Romæ* 1585.

Clus. Hisp. Caroli Clusii Atrebatis rariorum aliquot Plantarum, per Hispanias observatarum Historia, *Antuerpiæ* 1576.

Cluſ. Hiſt. Caroli Cluſii Atrebatis rariorum Plantarum Hiſtoria, *Antuerpiæ* 1601.

Cluſ. Hiſt. App. Cluſius in appendice Hiſtoriæ Plantarum.

Col. Part. 1. Columna Parte 1. Fabii Columnæ Lynæi minus cognitarum ſtirpium Ecphraſis, *Romæ* 1606.

Comm. Præl. & Rar. Caſparis Commelini Præludia Botanica, *Lugduni Batavorum* 1703.

Ejuſdem Horti Medici Amſtelodamenſis Plantæ rariores & exoticæ., *Lugd. Batav.* 1706.

Corn. Jacobi Cornuti Plantarum Canadenſium Hiſtoria 1685.

Dod. Pempt. Remberti Dodonæi Pemptades ſex, *Antuerpiæ* 1616.

Ferr. Heſpe. Joannis Baptiſtæ Ferrarii Heſperides, *Romæ*, 1646.

Hort. Amſt. Horti Medici Amſtelodamenſis rariorum Plantarum Hiſtoria, auctore Joanne Commelino tom. 1. 1697. auctore Caſparo Commelino, tom. 2. 1701.

H. L. B. Hortus Academicus Lugduno-Batavus, auctore Paulo Hermano, *Lugd. Bat.* 1687.

H. L. Bat. App. ejuſdem Appendix ibid. Hort. Eyſt. Hortus Eyſtetenſis operâ Baſilii Beſleri Philiatri & Pharmacopæi, *Norimbergæ* 1613.

H. R. P. & H. R. Par. Hortus Regius Pariſienſis, *Pariſiis* 1665.

J. B. Joannis Bauhini Hiſtoria Plantarum univerſalis, tribus voluminibus, *Ebroduni* 1650.

I. R. H. Inſtitutiones Rei Herbariæ, auctore Joſepho Pitton Tournefort, *Pariſiis* 1700.

I. R. H. App. Ejuſdem Appendix ibidem.

I. R. H. Cor. & Cor. I. R. H. Ejuſdem Corollarium.

El. Bot. Elemens de Botanique de M. Tournefort, 1694.

Lob. Icon. Mathiæ Lobelii Plantarum, ſeu Stirpium Icones, *Antuerpiæ* 1681.

Lugd. Hiſtoria Generalis Plantarum, *Lugduni* 1586.

Math. Petri Mathioli opera illuſtrata à Caſparo Bauhino, *Baſileæ* 1674.

Mor. Hiſt. Oxon. Plantarum Hiſtoria Univerſalis, auctore Roberto Moriſon, *Oxonii* 1679.

Mor. Umb. Plantarum Umbelliferarum diſtributio nova, auctore Roberto Moriſon, *Oxonii* 1672.

Mor. H. R. Bleſ. Hortus Regius Bleſenſis auctus, ſeu Præludia Botanica Moriſoni, *Londini* 1669.

Park. Th. Joannis Parkinſoni Theatrum Botanicum, *Londini* 1640.

Pluk. Phyt. Leonardi Plukenetii Phytographia, *Londini* 1691. 1692. & 1696.

Plum. Pl. Amer. Deſcription des Plantes de l'Amerique par le Pere Plumier, *à Paris* 1593.

Raii Hiſt. Joannis Raii, Hiſtoria Plantarum tomi tres, *Londini* 1686. & 1704.

Tab. Icon. Jacobi Theodori Tabernæ Montani Icones Plantarum, *Francofurti* 1590.

SUPPLE'MENT,

Ou Plantes obmises dans ce Catalogue.

ASperugo vulgaris, *El. Bot.* 111. — Bechique.
Buglossum Sylvestre caulibus procumbentibus, *C. B. Pin.*
Asperugo.

Cycuta minor petro-selino similis, *C. B. Pin.* 160. — Assoupissante.
Petite Cigue.

Fœniculum annuum umbellâ contractâ oblongâ, *I. R. H.* 311. — Aperitive.
Gingidium umbellâ oblongâ, *C. B. Pin.* 151.
Visnaga, *J. B.* 1. 393.
Visnaga.

Hieracium amygdalas amaras olens, seu odore apuli suave-rubentis, *H. R. P.* 129. — Histerique.
Herbe à l'Eprevier.

APPROBATION.

Nous soussignez Docteurs-Regens de la Faculté de Médecine en l'Université de Paris, commis par la Faculté à l'effet d'examiner un Manuscrit qui a pour titre : *Catalogue des Plantes du Jardin de Messieurs les Apoticaires de Paris*, &c. Certifions l'avoir lû, examiné & trouvé entiérement conforme aux Elemens de Botanique de feu M. Tournefort, dont il est extrait. En foy de quoi nous avons signé le présent Certificat. A Paris ce 25 Juin 1741.

Bernard de Jussieu.

Chomel, *Médecin ordinaire du Roy.*

APPROBATION.

Nous avons lû & examiné le *Catalogue des Plantes du Jardin de Messieurs les Apoticaires de Paris*, &c. & nous en croyons l'impression utile aux Etudians en Médecine, & aux Aspirans en Pharmacie. A Paris ce sixiéme Juillet 1741.

Bourdelin, *Ancien Doyen de la Faculté de Médecine de Paris, Professeur en Pharmacie, & Associé de l'Academie Royale des Sciences.*

Besnier, *Professeur en Pharmacie.*

APPROBATION.

VU l'Approbation de Meſſieurs BERNARD DE JUSSIEU ET CHOMEL, Docteurs-Regens en Médecine de la Faculté de Paris, nommés par Elle pour examiner un Manuſcrit intitulé : *Catalogue des Plantes du Jardin de Meſſieurs les Apoticaires de Paris, &c.* Vû auſſi l'Approbation de Meſſieurs BOURDELIN ET BESNIER, Profeſſeurs de Pharmacie ; je conſens pour ladite Faculté que ledit Manuſcrit ſoit imprimé, perſuadé qu'il ſera utile aux Etudians en Médecine & aux Aſpirans en Pharmacie. A Paris le 8 Juillet 1741.

COLDEVILARS, *Doyen de la Faculté de Médecine de Paris.*

Table
des Plantes, Arbres et.
Arbrisseaux Contenus
dans ce Catalogue
par Ordre Alphabétique

1757.

par J. Ch.er Q.

Vertu	A.	fo.
Deeb.	Abricotier	92
Stom.	absinthe 4 Especes	66
	Abutilon	9
	Acanthe 2 especes	21
Deob.	achilée	70
id.	acacia	96
id	Adiante 2 especes	4
Ape.	Ache	44
at. l.	aleluya 2 especes	8
	apocin qui porte La houette	8
Em.	Alcée	9
ap.	androsace	13
	aristoloche 4 especes	20
L. d. l.	agripaume	24
d. De.	Ambroisie Sauvage	30
V.	alisson Vivace de montagne	31
l. d.	aliaire	31
as.	amaranthe	33
ap.	asezrum	38
l. d.	anemone Sauvage	41

A

Vertus — A

Vertu	B	f°
pur.	Belle de de Nuit ou Jalap	13
Bech.	Bourache	13
id	Buglosse — 3 esp	14
id	Bourache herbe aux Nombril	16
antisco.	Becabunga · 2 esp	17
Em.	Bouillon Blanc 2 esp	17
V. ap.	Brunelle ou Brunette	23
Cepr.	Bazilic 2 esp · grand	23
id	dito pt 2 espece	26
id	dito 2 esp	28
id	Betoine	28
V as	Bugle 2 esp	29
diur	Barbe de chevre	39
febri	Benoitte ou Cariophilata	42
ant Ser.	Belle ou ache d'eau	43
ap.	Boucage persil de Bouc	45
Sud	Benjoin françois Imperatoire	47
Em.	Berce fausse Branc Vrsine	48
V. J.	Behen Blanc	31
Em	Barbe Renard	39

...lertu	B	f°
V.d.	Balsamine 2 esp ------	60
ap	Bardanne 2esp ------	62
opt-	Bluet aubifoin ----	64
ap..	Boulette echinope ------	67
fris	Botris --2esp ------	74
Em-	Bonheur -------	74
id	Blette -2esp ------	75
id	Bled Noir ou sarasin --	73
id	Bled froment ----	76
id	Bled turquie 2esp ----	77
d.as.	Bistorte --2esp ----	73
	Buis --- 2esp -----	80
ap..	Bouleau -----	83
ap.	Bruyere -----	87
pur.	Bagnaudier ----	96
	Buisson ardent ----	94
	Bois puant --	93

C

vertus	C	f°
al.&c.	Cresson a Lenoir	30
sich.	Choux - - 2 espèces	31
ant. de.	Cresson - - 3 espèces	32
id	Cochléaria	30
	Coquelicot V. Epavot	36
	Chardon St. de Am. V. pav.	36
ap.	Campsbrée	37
V. as.	Ciste qui p^te Le Ladanum 2 esp.	38
ap.	Caprier	39
ap.	Croix de Chevalier	40
	Coque Lourde herbe au vent	41
'uso.	Chelidoine p^te.	41
	Cumin Sauvage	43
ap.	Celery	44
asson.	Cigue (grande)	44
id	Carry de prez	44
Carm.	Carotte 2 espèces	45
id	Cherüy	45
hep.	Cerfeuille 3 espèces	46
Carm.	Coriande	47

C

Vertus

C

fo

D

E

F

F

Vertus		f°
hép.	Fumeterre	60
al. l.	Fraxinelle 2 esp	61
ap.	Frêne	80
v. ap.	Filaria (La)	83
v. as.	Fustet	89
pur.	Frangula	90
Ster	Fusain	90
Be.	Figuier	97

Vertus	G	f.o
em-	Guimauve - - - - - -	9
ap -	Garence 2 espec - - -	11
febri	Gentianne 2 espec - - -	12
ap.	Gremil 2 espe - - - -	13
aslt.der.	Glaux - - - - - - - -	16
pur.	Gratiola herbe aup. h. - -	20
res.	grassette - - - - - - -	20.
febri.	Germandrée 2 espec - - -	28.
bis	Giroflée jeaune - - - -	31
ap.	Géum oupt Sanicle de Mon.	37
d. as.	Geranium 3 espec - - -	40
bis	Glayeul 2 espec - - - -	53
res.	gesse - - - - - - - -	57
	galega ou rue de chevre - -	57
	Gaude ou herbe a jeaunir - -	60
	Gnaphalode - - - - - -	63
d. d.	Globulaire - - - - - -	67
sud	Genevrier - - - - - - -	84
pur.	Garou ou Lauréole - - - -	83.

Vertu	G H	f°
v. as.	Gayac - - - - - - - -	86
cepl.	Guy - - - - - - -	88
rafr.	Guignier - - - - - - - - -	92
v. as.	grenadier - - - - - - - - -	93
	groselier 3 esp - - - -	93
ap - -	genest 3 esp. - - - - -	93
v. as.	guaignier - - - - - -	95
	genest Comun - - - -	96

Vertus	H	f.
h.	hépatique de fontaine - - -	3
ap.	houx frelon - - - - -	6
h.	hépatique des bois - - -	11
	hépatique de jardins - - - -	42
	hépatique dorée - - - -	17
Ster	herbe ala reine - - - -	12
raf.	herbe aux puces - - - -	13
	herbe alaequinancie - - -	14
V. d.	herbe aux verrue - - - -	15
	herbe aux ecus ou Nummulaire	16
v. d.	herbe aux Mittes - - - - -	17
	herbe Musquée - - - - -	19
	hisopes 2 espèces - - - -	27
an. de.	herbe Ste Barbe - - - -	32
asso.	hipécoon - - - - - -	33
	herbe St Christophle - - - -	42
	herbe St Etienne - - - - -	43
	herbe St Antoine ou St L. rose	43
	herbe a 7 tiges - - - -	32

K

L

L

M

N

Vertus

P

Vertu

P

Q

Vertus	R	f°
V. as.	racine vierge ou sceau de n.d.	10
raf.	reponse	10
V. D.	reponse sauvage	11
ap.	rieble ou le pateron	11
ceph.	romarin dr	25
	rose de Jerico V. thlaspie	30
	raifort 2 espece — 30	32
an. sc.	roquette 2 espece	32
ap.	rave 2 espece	33
ap.	radix 2 esp.	33
ster	roquette des champs	34
al. c.	raisin de renard	35
bech.	rosée du soleil	36
his	rue 2 esp.	38
diap.	reine des prez	39
V. ap.	rüe des prez ou talictrum	40
V. D.	renoncule 4 esp.	41
	raisin d'amerique phito.	42

R

Vertus **S.**

Vertus

S

T

Vertus

T

V